

당뇨 환자를 위한 계절 과일 가이드

당뇨가 있다고 과일을 끊으실 필요는 없습니다. 오히려 과일을 적당히 드시는 분들이 당뇨 위험이 더 낮았어요. 중요한 건 '단맛'이 아니라 과일 속 '포도당'입니다.



핵심 — 혈당을 올리는 건 단맛이 아니라 '포도당'이에요

수박 0.5 g 포도당 · 달아도 안심	사과 2.6 g 포도당 · 과당 우세	복숭아(백도) 4.3 g 포도당 · 혈당 ↑	단감 · 바나나 5.8 g 포도당 · 혈당 ↑↑
---	--	--	--

과일 100g에 든 **포도당** 양입니다(농촌진흥청 성분표). 포도당은 혈당을 곧바로 끌어올리지만, **과당**은 훨씬 천천히 오릅니다. 그래서 **수박**은 달아도 포도당이 거의 없어 괜찮고, 복숭아·단감·바나나는 포도당이 많아 같은 양을 드셔도 혈당이 더 오릅니다.

과일 신호등 — 무엇을, 얼마나 (1회분 = 학회 기준 50kcal)

● 권장 — 안심

수박 1쪽(150g) · 딸기 7알(150g) · 사과 ½개(80g) · 배 ¼개(110g) · 귤 1개(120g) · 블루베리·키위·자두 · 방울토마토(비제한)

● 양 조절 — 반 개·소량

복숭아 반 개(100g) · 단감 반 개(50g) · 바나나 반 개(50g) · 포도·거봉 한 줍(80g) · 파인애플 · 망고 · 한라봉·천혜향

● 주의 — 아주 소량

샤인머스켓(한 송이=하루치) · 홍시 · 꽃감 · 건포도·대추·밤 · 과일주스 · 과일청·유자청

같은 과일이라도 결국 **'한 번에 얼마나'**가 관건입니다. 이 신호등은 당지수(GI) 하나만 본 게 아니라, **포도당 양과 실제로 드시는 양**을 함께 따져서 나눈 겁니다.

꼭 기억할 두 가지 · KEY

수박 — 달아도 괜찮아요. 당지수(GI)는 높지만 포도당이 거의 없고 수분이 91%라, 한두 쪽(150g)이면 혈당 부담이 크지 않아요. 대신 **반 통씩은 안 됩니다.**

복숭아 — 반 개까지. 우리나라 백도·황도는 포도당이 많아서 사과나 배보다 혈당을 더 올립니다. 무르지 않은 걸로 반 개, 큰 것 한 개면 벌써 2~3인분이에요.

사탕처럼 생각하세요 · DON'T

과일주스 — 갈면 섬유질이 깨져 당만 남아요. 생과일 대신은 안 됩니다

말린 과일(꽃감·건포도·대추) — 물이 빠지면서 당이 농축됩니다

과일청·유자청 — 사실상 설탕물이에요

드시는 법 — 빈속보다는 식후에, 밥·빵 같은 다른 탄수화물과 겹치지 않게

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한당뇨병학회 식품교환표(2010 개정) · Muraki 2013 BMJ · 농촌진흥청 국가표준식품성분표

본 자료는 일반적 권고이며, 환자별 약(인슐린·설폰닐우레아) 용량·합병증·신기능에 따라 달라질 수 있습니다. 혈당은 과일 종류·양·먹는 시간에 따라 개인차가 큼니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/lifestyle/diabetes-fruit-guide/