

심비코트 라피헬러, 그림으로 보는 사용법

부데소니드/포르모테롤 · 가압식 정량분무(pMDI) — 흔들어 쓰는 흡입기입니다. 준비부터 사용 후 관리까지 **6단계**로, 약이 폐 깊숙이 잘 전달되고 부작용은 줄이는 올바른 방법입니다.



1

흔들기 SHAKE

사용 전 5초간 위아래로 잘 흔듭니다. 첫 사용·7일 이상 미사용·떨어뜨린 경우엔 허공에 시험분사 2회.



2

숨 내쉬기 BREATHE OUT

흡입기를 입에서 떼 채, 숨을 편안하게 끝까지 내쉽니다. 흡입기에 대고 내쉬지 않습니다.



3

흡입 + 분사 INHALE & ACTUATE


흡입구를 입에 물고 천천히 깊게 들이쉬며 캔을 1번 누르고, 그대로 계속 들이쉽니다.



4

숨 참기 HOLD BREATH

흡입기를 빼고 10초간(가능한 만큼) 숨을 참았다가 천천히 내쉽니다.



5

★ 가장 중요

입 헹구기 RINSE

사용 후 **물로 입을 헹구고 뱉습니다**. 구강 칸디다(아구창)·목 심을 예방합니다.



6

청소 CLEAN

흡입구는 **마른 휴지**로만 닦습니다 (주 1회). **물 세척 금지** — 젖으면 분사량이 달라집니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: 제조사 사용설명서(IFU) · GINA 2024 (Global Initiative for Asthma) 흡입기 사용 권고 · 대한결핵및호흡기학회 흡입기 교육자료. 본 자료는 환자 교육용 요약이며 실제 처방·용량은 담당 의사 지시를 따르세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/respiratory/symbicort-inhaler-technique/

스페이서(챔버), 이렇게 함께 쓰세요

스페이서(밸브형 흡입 보조기구, valved holding chamber)는 흡입기와 입 사이에 끼우는 투명한 통입니다. 약이 **폐에 더 잘 도달**하고 입·목 부작용은 줄어, 흡입 타이밍을 맞추기 어려운 분·소아·고령자에게 특히 권장됩니다.

스페이서를 쓰면 좋은 점 · Why

폐 도달률 ↑

입·목에 남는 약이 줄고, 더 많은 약이 폐 깊숙이 전달됩니다.

부작용 ↓

입안에 닿는 스테로이드가 줄어 구강 칸디다·목 심·쓴맛이 감소합니다.

타이밍 부담 ↓

누르기와 들이쉬기를 정확히 맞추지 않아도 돼 소아·고령자에게 특히 좋습니다.

사용 방법 · How to Use



- 1 흡입기 뚜껑을 열고 **5초간 흔든 뒤**, 스페이서 한쪽 끝에 끼웁니다.
- 2 숨을 끝까지 내쉰 다음, 스페이서 마우스피스에 입을 물고 입술로 감쌉니다.
- 3 캔을 **1번 눌러** 약을 챔버 안으로 분사합니다.
- 4 천천히 깊게 들이쉬고 **10초** 참습니다. 한 번에 깊게 못 쉬면 챔버를 문 채 **4~5회 천천히 호흡**해도 됩니다.
- 5 2회 분사 처방이면 30초 기다렸다 다시 흔들어 ①부터 반복합니다.

사용 후 · 세척 · Cleaning

- 사용 후에는 **물로 입을 행굽니다** — 스페이서를 써도 입 행구기는 매번!
- 세척은 주 **1회**, 미지근한 물에 **소량의 주방세제**를 풀어 부드럽게 행굽니다.
- ★ **중요** — 행군 뒤 **털거나 수건으로 닦지 말고** 세워서 **자연 건조**합니다. 문지르면 정전기가 생겨 약이 챔버 벽에 달라붙습니다.
- 부품이 갈라지거나 밸브가 손상되면 **교체**합니다 (보통 6~12개월).



광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: 제조사 사용설명서(IFU) · GINA 2024 흡입기 사용 권고 · 대한결핵및호흡기학회 흡입기·스페이서 교육자료. 본 자료는 환자 교육용 요약이며 실제 처방·기구는 담당 의사 지시를 따르세요.