# 속이 불편하면 식사법부터 조정

오심, 더부룩함, 변비, 설사는 흔하지만 방치하면 탈수와 치료 중단으로 이어질 수 있습니다.
증상별 대응법을 미리 정합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

# 가장 흔한 불편감은 위장관에서 옵니다

대부분은 시간이 지나며 줄지만, 심한 증상은 증량 속도와 식사법을 다시 봐야 합니다.

### 오심

소량씩, 기름기 줄이기, 식사 후 바로 눕지 않기.

### 변비

수분, 섬유질, 걷기, 필요 시 진료 후 약 조정.

### 설사

탈수 신호를 보고, 지속되면 진료에 알립니다.



그림 · 위장관 증상 관리 — 위장관과 수분 및 작은 식사 일러스트(설명용 그림).

Tip · 오심·구토·설사·변비는 약 자체뿐 아니라 과식, 기름진 음식, 식사 속도, 수분 부족과 함께 생깁니다. 원인을 나눠 보면 조절할 수 있습니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 양보다 속도가 먼저입니다

빨리 먹으면 포만감이 늦게 따라와 과식하고, 이후 더부룩함이 오래 갑니다.



### 먼저 기억할 점

한 번에 많이 먹기보다 작은 양을 천천히 먹습니다. 속이 불편한 날은 담백한 단백질과 부드러운 채소부터 시작합니다.

### 소량

평소의 1/2–2/3부터 시작해 불편감에 맞춥니다.

### 천천히

15–20분 이상, 한 입마다 잠깐 멈춥니다.

### 담백하게

튀김·크림·매운 음식·야식은 증상이 안정될 때까지 줄입니다.

Tip · 한 번에 많이 먹기보다 작은 양을 천천히 먹습니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항 · 광교바른내과 진료 안내(식사 분량·속도 예시)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 변비는 물·섬유질·활동량이 같이 움직입니다

식사량이 줄면 대변량도 줄어 변비가 더 잘 생깁니다.



그림 · 걷기와 수분 — 수분과 섬유질과 가벼운 걷기 일러스트(설명용 그림).

| 살펴볼 것 | 실천 방법 |
| --- | --- |
| **수분** | 소변 색이 진하고 어지러우면 부족 신호일 수 있습니다. |
| **섬유질** | 채소·해조류·콩류를 천천히 늘립니다. |
| **활동** | 식후 10분 걷기는 장운동에도 도움이 됩니다. |

Tip · 변비 대처는 한 가지가 아니라 조합입니다. 물만 마시고 움직이지 않거나, 섬유질만 늘리고 물이 부족하면 더 불편할 수 있습니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항 · 미국 질병통제예방센터 신체활동 지침(걷기)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 이번 회차는 작게, 천천히, 촉촉하게

이번 주는 증상 일지를 쓰고, 수분과 식사 속도를 먼저 조절합니다 · 집에서 볼 1장 요약: **시작 안내문**

## 이번 회차 핵심

01 오심·변비는 흔하지만 조절 가능한 신호입니다.

02 작게 먹고 천천히 먹는 것이 첫 번째 처방입니다.

03 수분·섬유질·걷기는 변비 관리의 세트입니다.

04 증상이 심하면 7회차 위험 신호 기준대로 바로 연락합니다.

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

**참고한 자료** 위고비·마운자로 허가사항 · 한국릴리 안내
미국 질병통제예방센터 신체활동 지침
미국비만의학회 영양 권고 · 광교바른내과 진료 안내