많이 묻는 영양제, 근거로 정리했습니다

관절·뇌·눈 영양제는 근거가 엇갈리거나 부족해요. **무릎은 체중·허벅지 근력, 아플 땐 바르는 약이 먼저**예요.

● **근거 높음** 큰 연구로 확인 ◐ **엇갈림** 연구마다 다름 ○ **근거 부족** 연구가 작거나 효과 없음

관절 영양제 — 효과는 엇갈리거나 부족해요

성분	근거	알아둘 점 · 주의
글루코사민 · 콘드로이친	◐ 엇갈림	미국 진료지침은 **무릎·엉덩이 관절에 권하지 않아요.** 출혈 와파린(피 묽게 하는 약)과 함께 드시면 피가 더 묽어질 수 있어요.
MSM	○ 근거 부족	요즘 많이 찾지만 **연구가 모두 작아요.**
강황 (커큐민)	◐ 엇갈림	연구가 더 필요해요. 간 흡수를 높인 제품에서 간 손상이 보고됐어요. 출혈 피 묽게 하는 약과는 상의하세요.
보스웰리아	◐ 엇갈림	작은 연구에서 통증이 줄었고 **부작용은 적어 보여요.**

원장님 한마디 — 영양제는 예방 차원, 치료약은 진통제예요. **그보다 체중과 허벅지 근력이 더 중요해요.**

무릎에 근거가 높은 3가지 — 영양제보다 먼저



1. ● **체중 줄이기** — 무릎 부담을 줄여요. 체중이 많이 나가면 **몸무게의 5%**만 줄여도 좋아질 수 있어요.
2. ● **걷기 · 허벅지 근력 운동** — 허벅지 앞 근육이 **무릎을 받쳐 줘요.**
3. ● **아플 땐 바르는 소염진통제부터** — 파스·연고는 **"거기만 작용하니까"** 위·콩팥 부담이 적어요. 먹는 진통제는 심장병이 있으면 먼저 상의하세요.

뇌 · 눈 영양제 — 광고 문구보다 근거를 보세요

성분	근거	알아둘 점 · 주의
포스파티딜세린 (PS)	○ 근거 부족	미국 식품의약국은 치매 예방 근거가 **"매우 제한적"**이라고 봐요. 부작용이 많은 성분은 아니에요.
은행잎 추출물	○ 근거 부족	75세 이상 3,069명을 6년 지켜본 시험에서 **치매 예방 효과가 없었어요.** 출혈 피 묽게 하는 약과 주의
루테인 · 지아잔틴	◐ 엇갈림	건강한 분은 예방 근거가 부족해요. **황반변성**(눈 중심 시력이 상하는 병) 진단을 받았다면 드실지는 안과에서 정하세요.

병원에서 처방하는 뇌 기능 개선제(콜린알포세레이트)는 **진료 때 상의**하세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진


뒷면에 탈모 치료와 멈추고 연락할 증상이 이어집니다.

탈모 치료 — 허가된 치료부터, 혈압약 드시면 먼저 상의

치료	식약처 허가	알아둘 점
먹는 약 피나스테리드 · 두타스테리드	성인 남성 탈모 ● **근거 높음**	**남성 탈모의 표준 치료**예요. 여성·어린이는 먹지 않고, 임신 중·임신 가능 여성은 **부서진 알약·새는 캡슐을 만지지 마세요**(닿으면 바로 비누·물로 씻기). 성기능·기분 변화가 생기면 상의하세요. 두타스테리드는 끊은 뒤 **6개월간 헌혈 금지**예요.
바르는 미녹시딜 액 · 폼	남녀 모두 5% 액은 남성만	하루 2번(여성 폼은 1번), **최소 4개월**(여성 폼은 3~6개월) 써 봐야 효과를 알아요. 멈추면 다시 빠질 수 있어요. **임신 중이거나 임신 가능성이 있거나 수유 중이면 쓰지 마세요. 폼**은 액의 용매(프로필렌글라이콜)가 없어 덜 가렵고 덜 따가울 수 있어요.
먹는 미녹시딜	**고혈압 약** 탈모 허가 없음	혈압을 낮추는 약이라 **혈압약을 드시는 분은 혈압이 더 떨어질 수 있어요.** 두 약을 처방한 선생님께 모두 알려 주세요.

혈압이 높거나 낮은 분, 심장병이 있는 분은 바르는 미녹시딜도 허가사항에 '사용하지 말 것'이에요 — **먼저 상의하세요.** 전립선 피검사(PSA) 전엔 피나스테리드·두타스테리드를 알려 주세요.

바르는 미녹시딜, 처음엔 더 빠질 수 있어요 — 텃밭 비유



① 텃밭 좋아짐　② 약한 털 빠짐　③ 다시 자람

> **원장님 한마디** — 혈관이 넓어져 **텃밭이 좋아지면 비실비실했던 놈들이 빠져요.** 빠지고 나서 다시 자라요.

2주 넘게 계속 더 빠지면 바르기를 멈추고 상의하세요.

⚠ 이럴 때는 바로 연락하세요

1. **심한 피로·메스꺼움·입맛 없음**, 소변이 진해지거나 **눈·피부가 노래짐** — 간 신호예요. **영양제를 멈추세요.** 간수치가 높다고 들었을 때도 영양제부터 줄이고 상의하세요.
2. 피 묽게 하는 약을 드시는데 **멍·코피·잇몸 출혈**이 늘었을 때 — 영양제는 멈추되, **피 묽게 하는 약은 스스로 끊지 마세요.**
3. 미녹시딜 시작 뒤 **어지럼·두근거림·가슴 통증·붓기·급한 체중 증가** — **바르는 약은 바로 멈추고**, 먹는 약은 처방한 선생님께 연락. 가슴 통증이 심하거나 쓰러질 것 같으면 **119**

다른 병원에서 받은 약과 영양제도 편하게 말씀해 주세요. **드시는 것을 모두 알려 주시면** 함께 맞춰 봅니다. 모발 영양제 성분 **비오틴**을 많이 드시면 피검사 결과가 달라질 수 있어 **검사 전에 알려 주세요.**

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 미국류마티스학회 2019·OARSI 2019 골관절염 지침 · Cochrane 2014 · 미국 NCCIH·FDA · JAMA 2008·2013 · 식약처 허가사항(2026-10 조회) · 본원 진료 설명

교육·참고용 안내문입니다. 영양제와 약은 담당 의사와 상의해 정합니다.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/supplement-evidence-summary/