

만성두드러기, 꾸준히 관리하면 나아집니다

만성두드러기 (Chronic Urticaria, CU) 의 원인·진단·단계별 치료를 환자
눈높이로 안내합니다

6주 넘게 반복되면 만성두드러기입니다

가렵고 부푼 피부가 자주 나타나며 깊은 부종이 함께 올 수 있습니다



6주

반복 기간

부푼 피부와 가려움이 6주 넘게 반복되면 만성으로 봅니다. 피부가 부푸는 자리가 바뀌기도 합니다.

전염병은 아닙니다



24시간

한 팽진의 변화

개별 부풀음은 보통 하루 안에 사라지고 다른 곳에 다시 생깁니다. 한 자리에 오래 남으면 다시 확인합니다.

오래 남으면 다시 확인



증상 조절

가려움과 부풀음, 부종을 기록하고 치료 반응을 보며 단계별 치료를 정합니다.

꾸준한 치료

입술·혀가 붓거나 숨이 차면 마지막의 응급 신호를 확인하세요.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

저절로 생기거나 자극을 받으면 생깁니다

발생 양상을 기록하면 원인을 좁히는 데 도움이 됩니다

자발성 두드러기

특별한 자극 없이 나타나므로 한 가지 음식만 원인으로 단정하지 않습니다.

- 특별한 자극 없이 갑자기 가려운 피부가 부풀어 오름
- 부푼 자리가 바뀌며 왔다가 사라지기를 반복
- 정해진 음식 한 가지에 대한 알레르기와는 다른 경우가 많음

vs

유발성 두드러기

찬물·압박·열 같은 특정 자극 뒤에 나타납니다. 어떤 상황에서 생겼는지 적어 두세요.

- 찬 공기나 찬물에 닿은 피부에 가려움과 부풀음이 생김
- 피부를 긁거나 압박받은 자리에 부풀음이 생김
- 운동·열·햇빛 같은 자극 뒤에 증상이 생김

특정 자극이 보이면 날짜와 상황을 적어 오세요.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

피부에서 가려움 물질이 나옵니다

피부의 면역세포가 히스타민을 내보내면 붓고 가렵습니다

피부 반응

피부 면역세포에서 히스타민이 나오면 혈관이 넓어지고 물기가 새어 피부가 부풀고 가렵습니다.

약이 하는 일

항히스타민제는 히스타민의 작용을 줄여 가려움과 부풀음을 가라앉힙니다. 치료 반응을 보며 약을 조정합니다.

꾸준히 복용

증상이 가라앉아도 처방한 기간은 꾸준히 복용합니다. 약을 줄이거나 끊는 시점은 진료에서 상의합니다.




그림 · 피부가 부풀고 가려워지는 과정을 보여 줍니다.

복잡한 면역 검사명보다 증상 양상과 치료 반응이 중요합니다.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

수면과 다른 증상도 함께 이야기하세요

가려움이 생활에 미치는 영향을 진료실에서 살핍니다

갑상선 질환

일부에서는 갑상선 문제와 함께 나타날 수 있습니다. 관련 증상과 검사 여부를 진료에서 상의합니다.

알레르기 질환

비염·천식·아토피피부염이 함께 있을 수 있습니다. 다른 피부·호흡기 증상도 진료 때 알려 주세요.

수면과 마음

가려움 때문에 잠을 못 자거나 불안하면 함께 치료 계획에 반영합니다. 생활에 지장이 있는지도 말해 주세요.

다른 전신 증상

열·관절통·체중 변화가 있으면 진료 때 알려 주세요. 두드러기 외의 증상은 다른 원인을 살필 단서입니다.

두드러기가 있다고 모든 분에게 같은 검사가 필요한 것은 아닙니다. 증상 양상과 진찰 결과에 맞춰 정합니다.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

일주일 동안 부풀음과 가려움을 적어 보세요

매일 기록하면 치료가 얼마나 듣는지 비교하기 쉽습니다



그림 · 기록은 증상 변화 확인에 도움이 됩니다.

점수 계산보다 매일 같은 방식으로 기록하는 것이 중요합니다.



매일 기록

하루 동안 부풀어 오른 곳의 수와 가려움 정도를 적습니다. 매일 같은 방식으로 기록해야 변화를 비교할 수 있습니다.



몸의 변화

부풀음이 한 자리에 얼마나 오래 남는지, 입술·눈꺼풀이 붓는지도 적습니다. 깊은 부종이 있다면 함께 알립니다.



다음 진료에 가져오기

7일 동안 기록한 내용을 다음 진료에 보여 주면 치료 반응을 살피고 약을 조정하는데 도움이 됩니다.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

검사는 증상에 맞춰 선택합니다

광범위한 알레르기 검사가 항상 필요한 것은 아닙니다

기본 확인

진찰 뒤 염증·혈액·갑상선 검사 등이 필요한지 판단합니다. 모든 사람에게 같은 검사를 하지는 않으며 증상 양상과 동반 질환을 함께 봅니다.

자극이 의심되면

찬물·압박·열처럼 의심되는 자극에 맞춘 검사를 고려합니다. 자극을 받은 뒤의 반응도 함께 설명하세요.

오래 조절되지 않으면

증상이 오래 조절되지 않으면 다른 원인을 살피기 위한 검사를 추가할 수 있습니다.




그림 · 증상 양상에 맞는 검사를 고릅니다.

검사 종류는 병력과 진찰 결과에 따라 달라집니다.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

치료는 반응을 보며 단계적으로 조정합니다

약을 임의로 늘리거나 끊지 마세요



졸음이 심한 오래된 항히스타민제와 전신 스테로이드의 장기 사용은 권하지 않습니다. 용량·기간은 담당 의사가 정합니다.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

국내에서도 허가된 먹는 표적 치료제가 있습니다

기존 약으로 잘 조절되지 않는 경우의 선택지입니다

레미브루티닙

먹는 표적 치료제로, 히스타민이 나오는 과정을 줄입니다. 기존 약으로 조절되지 않는 경우를 대상으로 연구했습니다.

연구 결과

12주 연구에서 약 절반이 잘 조절되는 수준에 도달했습니다. 개인별 반응은 다를 수 있습니다.

나에게 맞는지는

국내에서도 허가된 약이지만, 본인에게 적합한지는 진료에서 확인해야 합니다. 기존 치료를 임의로 중단하지 마세요.




그림 · 치료 효과는 개인마다 다릅니다.

새 약이 모든 분의 기존 치료를 대신하는 것은 아닙니다.

근거 · REMIX-1·2 연구, NEJM 2025 · 식약처 허가 2026

악화 요인을 피하고 약을 꾸준히 드세요

증상을 기록해 본인에게 맞는 관리법을 찾습니다

도움 되는 습관

피부 자극을 줄이고 생활 리듬을 지키며, 증상이 달라진 날을 기록합니다.

- 규칙적으로 자고 스트레스를 관리하며 증상과의 관계를 기록
- 무향 보습제를 발라 피부 건조와 자극을 줄이기
- 부푼 곳과 가려움, 그때 받은 자극을 매일 기록
- 피부가 가라앉아도 처방약을 임의로 중단하지 않기

VS

주의할 자극

아스피린·이부프로펜 등 소염진통제는 두드러기를 악화시킬 수 있어 피하고, 해열·진통에는 아세트아미노펜을 사용합니다.

- 뜨거운 목욕·사우나
- 과음
- 꽉 끼는 옷과 압박
- 소염진통제 복용 전 의료진과 상의

증거 없이 여러 음식을 한꺼번에 제한하지 마세요.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

숨이 차거나 혀가 부으면 즉시 119

단순한 피부 두드러기와 구별해야 하는 응급 신호입니다

⚠ 입술·혀·목이 붓기

갑자기 붓고 삼키기 어려우면 즉시 119에 연락하거나 응급실로 갑니다.

⚠ 숨참·쌉쌉거림

가만히 있어도 숨쉬기 어렵거나 목소리가 변하면 응급입니다. 즉시 119에 연락하거나 응급실로 갑니다.

⚠ 어지럼·의식 변화

식은땀과 어지럼이 심하거나 의식이 흐려지면 즉시 119를 부릅니다.
누워 다리를 올리고 도움을 기다립니다.

👤 기다리는 동안

어지럽거나 식은땀이 나면 누워 다리를 올립니다. 숨이 차면 앉아서 구급대원을 기다립니다. 의식이 흐려지면 즉시 119에 알립니다.

호흡 곤란이나 의식 변화가 있으면 직접 운전하지 마세요.

근거 · 세계알레르기기구 아나필락시스 지침 2020

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

만성두드러기가 있는 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 치료는 진료에서 함께 결정합니다.

참고한 자료

국제 두드러기 진료지침 2022 · 세계알레르기기구 2020



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요