


## 어지럼, 빙빙 도는 것과 핑 도는 것은 다릅니다

핑 도는 느낌과 빙빙 도는 느낌은 원인이 다를 수 있어, 시작 시점·지속 시간·유발 상황을 함께 확인해야 합니다. 아래에서 내 증상이 어느 쪽에 가까운지 확인해 보세요.

🌀 핑 도는 것과 빙빙 도는 것, 느낌과 함께 시작 시점·지속 시간·유발 상황을 확인합니다



| 구분      | 🌀 핑 도는 것 · DIZZINESS                                                 | 🌀 빙빙 도는 것 · VERTIGO                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 느낌      | 일어설 때 핑 듭니다                                                          | 주변이 빙빙 듭니다                                                                          |
| 특징 및 원인 | 앉았다 <b>일어설 때 핑 도는 것</b> 은 빈혈·저혈압이 원인인 경우가 많습니다. 나이가 있으신 분들께 특히 흔합니다. | 누웠다가 일어나거나 돌아누울 때처럼 머리 위치가 바뀌면 <b>토할 것 같은 느낌</b> 이 동반되고 빙빙 도는 경우가 많습니다.             |
| 진료과     | 혈압·맥박을 확인하며 <b>내과</b> 에서 봅니다.                                        | <b>이석증</b> 같은 귀 문제가 원인인 경우가 많아 <b>이비인후과</b> 에서 봅니다. 가끔 뇌가 원인이면 <b>신경과</b> 에서 진료합니다. |

핑 도는 어지럼 관리 → 「일어설 때 핑 도는 분께」 [edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/orthostatic-dizziness-low-bp/](http://edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/orthostatic-dizziness-low-bp/)

🧠 이석증은 재발을 잘 합니다

| 구분    | 이석증(BPPV) · 재발 주의                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 진단 방법 | 이석증은 진찰 중 머리 위치를 바꾸어 증상과 눈 움직임을 확인해 진단합니다.                                                          |
| 생활 주의 | <b>재발을 잘 하는 병</b> 입니다. 가장 흔한 이석증(뒤쪽 반고리관)은 자세 치료(이석 정복술) 뒤 고개 자세를 따로 제한할 필요는 없고, 다시 어지러우면 진료를 받으세요. |
| 약물 안내 | 어지럼약은 이석증을 고치는 약이 아니며, 자세 치료를 대신하지 못합니다.                                                            |
| 재발 대처 | 비슷한 어지럼이 다시 생기면 다시 진료받아 이석증 재발인지 확인하고, 결과에 맞는 치료를 받으세요.                                             |

🏥 이런 경우엔 바로 응급실로

### SPEECH

#### 말이 어눌할 때

말이 어눌하거나 말이 잘 나오지 않을 때

### WEAKNESS

#### 한쪽 힘이 빠질 때

얼굴·팔·다리 한쪽에 힘이 빠지거나 저릴 때

### VISION

#### 시야에 이상이 있을 때

사물이 두 개로 보이거나 한쪽 시야가 안 보일 때

### BALANCE

#### 침대에서 못 내려올 정도

어지러워서 앉거나 서기 어려울 만큼 심할 때

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — AAO-HNS 이석증(BPPV) 진료지침 2017 · HNO 어지럼 진료 학제간 권고 2025 · BPPV 재발 위험 메타분석 2022

본 자료는 일반 환자교육용입니다. 증상 양상이 다르면 내원해 확인하시고, 위험 신호가 나타나면 즉시 119에 연락하거나 응급실로 가세요.

QR 대신 입력 → [edu.gwanggyobarun.com/handouts/neurology/dizziness-vs-vertigo/](http://edu.gwanggyobarun.com/handouts/neurology/dizziness-vs-vertigo/)



집에서 다시 보기