

# 열이 나면 — 독감·코로나 검사는 언제 받나요?

감기약에 해열 성분이 들어 있으면 열이 일시적으로 내려갈 수 있습니다. 약을 먹는데도 열이나 오한이 났고 나오면 독감(Influenza)·코로나19(COVID-19) 검사를 받으러 오세요.

## 이럴 때 검사하러 오세요

### FEVER

#### 38도 이상 열

해열 성분이 든 감기약을 먹는데도 열이 났고 나올 때

### CHILLS

#### 오한

약을 먹는데도 으슬으슬 떨리는 오한이 올 때

### 48 HOURS

#### 증상 시작 48시간 안


독감 약은 증상이 시작되고 48시간 안에 써야 효과가 큼니다

### BEFORE HOLIDAY

#### 주말·연휴 전

병원이 쉬는 동안 48시간이 지나지 않게 미리 검사합니다

## 검사 결과는 이렇게 읽습니다



| 결과    | 이렇게 받아들이세요                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 음성    | 너무 일찍 검사하면 바이러스가 덜 붙어 <b>음성이 나올 수 있습니다</b> . 하루 지나 다시 하면 양성도 됩니다. 증상이 계속되면 다시 오세요.                                      |
| 양성    | <b>양성이면 감염 가능성이 높습니다</b> . 신속항원검사는 걸렸는데도 음성으로 나오는 경우(위음성)는 흔하지만, 안 걸렸는데 양성으로 나오는 경우(위양성)는 드뭅니다. 증상과 유행 상황을 함께 보고 판단합니다. |
| 증상 없음 | 증상·노출 여부에 따라 검사 시점을 상담하세요. <b>열이 없어도 호흡기 증상이 생기면 진료받으세요</b> .                                                           |

## 독감이면 이렇게 치료합니다

| 방법 | 먹는 약 · 타미플루   | 주사 · 페라미플루                                                                                                            |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기간 | 5일 동안 먹습니다    | 1회 맞으면 끝납니다                                                                                                           |
| 특징 | 처방받아 집에서 먹습니다 | 한 번의 정맥주사로 투약을 마칠 수 있어, <b>먹는 약이 부담스러운 분께 권해 드립니다</b> . 먹는 약보다 열이 하루쯤 빨리 떨어지는 경우가 많습니다(개인차가 있습니다). 비용은 접수에서 안내해 드립니다. |

치료를 시작했는데도 열이 계속되면 다시 진료를 받으세요 — 폐렴 여부를 엑스레이로 확인합니다(진료시간이 아니면 응급실). 나이가 많거나 지병이 있거나 증상이 심하면 48시간이 지나도 치료할 수 있습니다.

### 집에서는 · AT HOME

공간을 나누고 식사도 따로 합니다.  
가족과 있을 때는 **마스크**를 씹니다.  
**손 씻기**를 자주 합니다.  
물을 충분히 마시고 꼭 쉽니다.

### 흔한 오해 · MYTH

**“몸살엔 수액이나 엉덩이 주사 한 대면 된다”** — 수액은 부족한 수분·전해질을 채우고, 해열·진통 근육주사는 열과 통증을 덜어 회복을 돕습니다. 다만 독감 자체를 치료하는 약은 아니며, 항바이러스제는 증상·발병 시점·위험요인을 보고 처방합니다.  
**“독감도 일반 감기약으로 충분하다”** — 감기약은 증상만 덜어 줍니다.  
**“땀을 빼면 낫는다”** — 치료법이 아닙니다. 탈수를 조심하세요.  
**“음성이니 독감이 아니다”** — 초기엔 음성일 수 있습니다.

### 이럴 땐 바로 응급실로 · EMERGENCY

숨이 차거나 가슴이 답답하고 아플 때  
물을 못 마시거나 소변이 크게 줄 때

입술이 파래지거나 의식이 흐려질 때  
좋아지다가 다시 열·기침이 심해질 때

65세 이상·임신부·만성 심장·폐·신장 질환·당뇨·면역저하가 있으면 증상이 가볍더라도 일찍 진료를 받으세요.

함께 보세요 — 독감 약 비교 슬라이드: [edu.gwanggyobarun.com/decks/infectious/influenza-antivirals/](http://edu.gwanggyobarun.com/decks/infectious/influenza-antivirals/) · 감기 뒤 기침은 「감기 중·감기 뒤 기침」 안내문

## 광고바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광고중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 질병관리청 인플루엔자 관리지침 2025~2026 · 중증 인플루엔자 치료지침(대한내과학회지 2014) · CDC Rapid Influenza Diagnostic Tests 2026 · CDC Influenza Antiviral Medications 2026

본 자료는 열이 날 때 독감·코로나 검사 시점을 안내하기 위한 일반 자료입니다. 나이, 임신 여부, 면역상태, 기저질환에 따라 검사와 치료 시점이 달라질 수 있으니 진료 시 상의해 주세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → [edu.gwanggyobarun.com/handouts/respiratory/flu-covid-fever-testing/](http://edu.gwanggyobarun.com/handouts/respiratory/flu-covid-fever-testing/)