

인슐린 주사, 처음 시작하시는 분께

첫 자가 주사를 시작하는 당뇨 환자를 위한 5가지 핵심(보관·소독·부위·회전·용량). 통증을 줄이고 공복혈당에 따라 안전하게 용량을 맞춰 가세요.

📌 한눈에 보는 인슐린 시작 수칙

시작 용량 10 단위 / 일 (저녁 또는 자기 전 1회)	공복혈당 목표 80~130 mg/dL (아침 식전)	증량 기준 > 140 mg/dL × 3~4일 연속 시 +2단위	주사 간격 2~3 cm 떨어뜨려 매번 위치 회전
---	--	---	--

📌 통증을 줄이는 주사 전 3가지 준비



* 1. 냉장 → 상온 (30분 전) — 인슐린은 냉장 보관 (2~8°C). 차가운 채로 맞으면 통증이 큼니다. 30분 전 꺼내 상온에 둔 뒤 사용 (사용 중인 펜은 상온 28일).

📌 2. 알코올 소독 + 완전 건조 — 알코올 솜으로 닦은 뒤 완전히 마를 때까지 (약 10초) 기다림. 알코올이 남은 채 찌르면 따끔거림이 강해집니다.

3. 피부 잡고 90° 직각 — 피부를 살짝 집어 5~10초 유지 후 뽑습니다. 바늘은 한 번만 사용.

📌 주사 부위 — 어디에 맞고, 어디는 피하나요?

권장 부위 — 피하 지방이 두꺼운 곳	⚠️ 피해야 할 부위
① 복부 (배꼽 5cm 바깥) — 흡수 가장 빠름, 1순위	배꼽 주변 5cm 안 (혈관이 많음)
② 허벅지 앞·바깥쪽 — 무릎 위 한 뼀 ~ 사타구니 한 뼀 아래	같은 자리 반복 (지방위축)
③ 둔부 위쪽 바깥 — 흡수 느려 야간 기저인슐린 적합	멍·붓기·딱딱한 부위
④ 상완 뒤·바깥쪽 — 보호자 도움 권장	운동 직후 · 옷·벨트 조이는 자리

같은 부위 안에서도 매번 2~3cm 떨어뜨려 주사 위치를 돌려 가며 맞습니다.

📌 용량 조절 규칙 — 2단위씩 증량하는 법

1. 10단위로 시작 — 저녁 또는 자기 전 1회, 매일 같은 시간 · 2. 매일 아침 공복혈당 측정·기록 — 식사·물 섭취 전

아침 공복혈당	이렇게 합니다
140 초과가 3~4일 연속	다음 날부터 +2단위 증량 (10→12→14...)
80~130 에 들어오면	유지
저혈당 (70 미만)	-2단위 + 진료 문의

🚨 즉시 당원 섭취 + 진료가 필요한 경우

1. 저혈당 증상 — 식은땀·손떨림·어지럼·심한 공복감 → 사탕 3개 / 주스 1컵 즉시
2. 의식 저하·경련 — 즉시 119, 가족이 있다면 글루카곤 주사
3. 발열·구토·설사로 식사 못 할 때 — 인슐린 임의 중단 금지, 전화 문의 후 조정

함께 보기 — 설명 슬라이드 「당뇨, 오늘부터 함께 관리합니다」 edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/diabetes-first-visit/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — ADA Standards of Care in Diabetes 2026 (Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment) · 대한당뇨병학회 2025

진료지침 (인슐린 시작 및 적정화) · FIT (Forum for Injection Technique) 권고

본 자료는 일반 안내이며 개인의 상태에 따라 처방의 판단이 우선합니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/insulin-start/