

변비약, 이렇게 쓰세요

어떤 약을 언제 먹고, 언제 쉬는지 집에서 보는 약 사용 안내입니다. 자극성 하제는 필요할 때만 짧게, 삼투성 하제는 편하게 쓰세요.

변비약은 종류마다 쓰는 법이 다릅니다



한 줄 요약

삼투성 하제(마그밀·락툴로스)는 필요할 때 편하게, **자극성 하제**(돌코락스·메이킨 등)는 며칠씩 안 나올 때 짧게 쓰는 '구조용'입니다.

변비약을 먹다 **설사가 나면 변비약부터 쉬고**, 콩팥이 약한 고령자는 **관장·마그네슘 제제를 조심**하세요.

생활습관(물이 부족했다면 채우기·매일 걷기·키위·푸룬·차전자피)은 진료실 **「변비 설명 자료」**에 자세히 있습니다 — edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/chronic-constipation/

삼투성 하제 vs 자극성 하제

구분	삼투성 하제 · 마그밀·락툴로스	자극성 하제 · 돌코락스·메이킨 등
어떻게 듣나	장 안에 수분을 머물게 해 배변을 돕습니다.	장을 직접 자극해 배변을 유도합니다.
언제 · 얼마나	의존이 적어 필요할 때 편하게 쓸 수 있습니다.	며칠씩 안 나올 때만 짧게 쓰는 구조용 약입니다(보통 4주 이내). 매일 습관처럼 먹지 마세요 — 매일 필요하다면 진료실에서 약을 다시 정합니다.
주의	락툴로스는 가스·복부팽만 이 흔하고, 마그밀은 콩팥 기능 을 확인해야 합니다.	사용 계획은 진료실에서 확인하세요.

이런 상황엔 이렇게 하세요

상황	이렇게 하세요
변비약 먹다 설사가 나면	설사약을 더하지 말고 변비약부터 쉬세요. 추가 복용을 멈추고 지켜보고, 설사가 계속되거나 심하면 진료를 받으세요.
콩팥이 약한 고령자	관장, 특히 인산염 관장 을 조심하세요. 마그네슘 제제 (마그밀 등)도 주의가 필요합니다. 콩팥 기능이 걱정되면 진료 시 미리 말씀해 주세요.
"센 변비약이 좋은 약"?	빠르게 듣는 약이 모두에게 맞는 것은 아닙니다. 내 상태에 맞는 약을 고르는 것이 우선입니다.
"약 먹을 때만 나오니 계속 먹어야 한다"?	약이 필요할 만큼 변비가 지속되고 있다는 뜻일 수 있습니다. 생활습관을 함께 조절하며 약을 다시 평가하세요.

바로 진료가 필요한 경우

다음 중 하나라도 있으면 바로 진료를 받으세요 — **소량의 혈변**, 원인 모를 **체중 감소나 빈혈**, 배·항문에서 만져지는 **덩이**, 마그네슘 제제 복용 중 **무기력·졸림·어지럼**. ☎ 031-893-4560

피가 많이 나오거나 검고 끈적한 변(타르변), 심한 복통·구토와 가스·변이 전혀 안 나올, 맥박이 느려지거나 의식이 흐려지면 응급실로 가세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한소화기장기성질환·운동학회 2022 서울 합의 지침 · AGA-ACG 2023 Chronic Idiopathic Constipation Guideline(PMID 37211380) · Management of Constipation in Older Adults, Am Fam Physician 2015(PMID 26371734) · Comparative Effectiveness of Kiwifruit, Psyllium, or Prunes, Am J Gastroenterol 2021(PMID 34074830)

본 자료는 일반 안내이며 환자 상태에 따라 처방의 판단이 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/laxative-guide/

