

마그네슘이 풍부한 식품

마그네슘 (Magnesium, Mg) 의 실질적인 급원은 **씨앗·견과** > **콩류·통곡물** > **진한 녹색채소** 순입니다. 근육 경련·변비·위산억제제(PPI) 장기 복용이 있다면 아래 식품을 매일 한 줌씩 곁들여 보세요.

🥜 가장 강력한 급원 TOP 5 · 가식부 100g당 mg



한 줌의 씨앗·견과가 하루 마그네슘의 든든한 시작입니다

순위	식품	mg/100g
1	치아씨	~335
2	아몬드 · 캐슈넛	~270
3	호박씨 (볶은 것 · 생것은 더 높음)	~260
4	다크초콜릿 (카카오 70~85%)	~230
5	메밀 (건조 · 통곡물)	~230

무가당 코코아파우더 ~500mg 으로 가장 높지만 1회 섭취량이 적어 실질 급원은 씨앗·견과입니다.

🥗 분류별 대표 식품 (가식부 100g당 대략치)

분류	대표 식품 · mg/100g
씨앗 · 견과	코코아파우더 ~500 · 치아씨 ~335 · 아몬드/캐슈넛 ~270 · 호박씨 ~260 · 다크초콜릿 ~230 · 땅콩 ~170
콩류	검은콩 · 대두 (건조) ~180~280 · 팥콩 ~60 · 두부 ~50 (간수 응고 시 더 높음) · 병아리콩 · 렌틸 (삶은 것) ~35~50
통곡물	메밀 (건조) ~230 · �트밀 (건조) ~140~180 · 현미밥 ~40~45 — 정제 곡물은 도정 중 대부분 소실
녹색채소 · 해조류 · 어류	시금치 · 근대 (익힌 것) ~85 · 고등어 ~80~95 · 연어 ~27~30 · 건조 다시마 · 미역 매우 높음 (1회량 적음)

❓ 알아두면 좋은 점

주제	이렇게 이해하세요
☹️ 흡수를 높이려면	통곡물 · 콩 · 씨앗의 피트산(phytic acid) 이 흡수를 방해합니다. 불림 · 발효 · 조리 하면 흡수율이 좋아집니다. 정제 · 도정 곡물은 마그네슘이 대부분 사라집니다.
🚫 상한섭취량 오해	상한섭취량 350mg/일은 보충제 · 제산제 등 식품 외 급원에만 적용됩니다. 신장 기능이 정상이면 식품으로 인한 과잉은 걱정할 필요가 없습니다 (남는 양은 소변으로 배설).

⚠️ 결핍 위험 · 상담이 필요한 경우

위산억제제(PPI) 장기 복용 시 저마그네슘혈증이 생길 수 있습니다(미국 식품의약국 경고) — 식이만으로 교정이 어려울 수 있습니다. **만성 설사 · 흡수장애 · 알코올 과다** 시 결핍이 늘어납니다. **신기능 저하** 시에는 마그네슘 완하제 · 제산제를 주의하세요.

👁️ **함께 보기** — 영양제 전반의 복용 원칙은 「영양제, 이것만 알고 드세요」 안내문을 보세요 (edu.gwanggyobarun.com)

광고바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일 · 공휴일 휴진

근거 — 국가표준식품성분표 · USDA FoodData Central · 보건복지부 한국인 영양소 섭취기준 (KDRIs 2020, 권장 남 350~370 / 여 280mg·일) · FDA PPI Safety Warning (2011)

함량은 품종 · 가공 · 조리에 따라 편차가 크므로 절대값보다 상대 순위로 참고하세요. 신장질환 · 심장질환 · PPI 장기 복용 등이 있으면 마그네슘 섭취 · 보충 전 담당의와 상담하세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/magnesium-rich-foods/