

위내시경 후 주의사항 (조직검사·CLO 검사)

조직을 떼어 낸 작은 자리는 1~2일에 걸쳐 아픕니다. 그동안 식사와 약에 짧은 제한이 있고, 결과는 따로 알려 드립니다.

🍴 식사와 활동 — 1주일 동안



언제	이렇게 하세요	이건 피하세요
검사 당일	수면에서 깬 뒤 1~2시간 지나 미음·죽부터. 보호자와 함께 귀가합니다.	검사 후 24시간 운전·기계 조작·중요한 결정
1~2일	연두부·흰살생선·삶은 채소 같은 부드러운 음식	격한 운동·사우나·찜질방·무거운 물건 들기
3~7일	조금씩 평소 식사로 돌아갑니다.	1주일 동안 술·맵고 자극적인 음식·튀김·날음식

💊 약 먹는 법 — 의사 지시가 먼저입니다

이렇게 드세요	⚠️ 1주일 동안 피하세요
피를 묽게 하는 약(아스피린·클로피도그렐·와파린·리바록사반·아픽사반·다비가트란 등)은 진료실에서 들은 날짜에 다시 드세요. 헛갈리면 전화로 확인하세요. - 아플 때는 아세트아미노펜(타이레놀)을 드세요. - 평소 먹던 위장약은 그대로 드세요. 제균 확인 검사 전의 약 조정은 담당 의사와 정합니다.	소염진통제(이부프로펜·나프록센·디클로페낙 등) — 떼어 낸 자리의 출혈 위험을 높입니다. - 피를 묽게 하는 약을 스스로 끊거나 미루는 것 — 심장 스텐트·뇌졸중·심방세동이 있으면 특히 위험합니다.

📋 결과와 헬리코박터 제균 치료

조직검사 결과	위염·궤양·헬리코박터·종양 여부를 현미경으로 확인합니다. 1~2주 뒤 알려 드리며, 연락을 못 받으셨으면 꼭 전화로 확인하세요.
CLO 검사 (헬리코박터 신속검사)	당일~며칠 안에 결과가 나옵니다. 양성이면 헬리코박터 파일로리균에 감염되어 있다는 뜻입니다.
🦠 양성이면 제균 치료	위산 억제제와 항생제 2~3가지를 처방받은 기간(삼제요법 14일·동시요법 10일) 동안 빠짐없이 드세요. 페니실린 알레르기는 미리 알려 주세요. 메트로니다졸이 들어 있으면 복용 중과 끝난 뒤 3일(72시간)은 술을 마시지 마세요. 약을 다 드시고 4주 이상 지난 뒤 숨을 불어 하는 검사(요소호기검사) 로 군이 없어졌는지 확인합니다. 정확한 결과를 위해 검사 전 2주는 프로톤펌프억제제·P-CAB(이름이 ‘-프라졸’·‘-프라잔’으로 끝나는 위산 억제제)을 쉬며, 멈추거나 바꿀 약은 담당 의사와 정합니다.
📅 다음 위내시경	조직검사 결과에 따라 보통 1~2년 뒤이며, 의사가 알려 드립니다.

🚑 바로 119 또는 응급실로 가야 하는 경우

피를 토하거나 커피 찌꺼기 같은 것을 토할 때 · 짜장면처럼 검고 끈적한 변이나 피가 섞인 변(떼어 낸 자리의 출혈 신호) · **가슴이나 배가 심하게 아프고 점점 심해질 때 · 어지러워 쓰러질 것 같거나 식은땀이 날 때 · 38℃ 이상 열·오한 · 숨이 차거나 삼키기 어려울 때.** 진료시간에는 ☎ 031-893-4560 으로도 연락하세요.

👉 조직검사를 하지 않으셨다면 → 위내시경 후 주의사항 (조직검사 없음)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — BSG/ESGE 항혈전제 지침(Gut 2021) · 대한상부위장관·헬리코박터학회 제균 치료 지침(2020) · ACG 헬리코박터 지침(2024) · ASGE 진정 지침(2018)

검사 잘 받으셨습니다. 본 안내는 조직검사·CLO 검사 후 일반 권고로, 기저질환·복용약에 따라 담당 의사의 지시가 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/post-egd-biopsy/

