

위내시경 후 주의사항 (조직검사 없음)

조직을 떼어 낸 자리가 없어 출혈 위험은 거의 없고 회복도 빠릅니다. 수면(진정) 회복과 드물게 생기는 위험 신호만 알아 두세요.

▶ 검사 당일부터 다음 날까지



언제	이렇게 하세요	이건 피하세요
검사 직후 30분~1시간	수면에서 완전히 깬 때까지 쉬고, 보호자와 함께 귀가합니다.	검사 후 24시간 운전·기계 조작· 중요한 결정
1~2시간 뒤	물을 한 모금씩 마셔 보고, 사레가 없으면 미음·죽·연두부부터 드세요.	목 마취가 풀리기 전 음식
당일 저녁	평소 양의 2/3 정도만 천천히 드세요.	맵고 뜨거운 음식·술·카페인
다음 날부터	평소 식사·운동·사우나·여행 모두 괜찮습니다.	—

❓ 흔한 불편과 위험 신호

대부분 저절로 좋아집니다	바로 119 또는 응급실로 가세요
목 따끔거림 — 내시경이 목을 지나가서 1~2일 갈 수 있습니다. 찬 음료가 도움이 됩니다. 트림·더부룩함 — 검사 때 넣은 공기 때문이며 1~2일 안에 좋아집니다. 졸림·가벼운 어지러움 — 수면 약 기운으로 당일에 남을 수 있습니다.	가슴이나 배가 심하게 아프고 점점 심해질 때(매우 드물게 식도·위에 구멍이 생긴 신호) 피를 토하거나 커피 찌꺼기 같은 것을 토할 때 짜장면처럼 검고 끈적한 변이나 피가 섞인 변(위장 출혈 신호) 어지러워 쓰러질 것 같거나 식은땀 — 보호자와 함께 119 38°C 이상 열·오한, 숨이 차거나 삼키기 어려울 때

📞 약 · 결과 · 다음 검사

평소 먹던 약	식사를 다시 시작한 뒤 평소대로 드세요. 조직검사를 하지 않아 따로 제한은 없습니다.
피를 묽게 하는 약	아스피린·클로피도그렐(플라빅스)·와파린·리바록사반(자렐토) 등은 진료실에서 들은 날짜에 다시 드세요 (보통 바로 다시 먹습니다). 헛갈리면 전화로 확인하세요.
당뇨약·인슐린	식사량이 돌아올 때까지 저혈당에 주의하고, 필요하면 상의하세요.
결과 안내	내시경 소견은 당일~며칠 안에 진료실 또는 문자로 알려 드립니다. 연락을 못 받으셨으면 전화 주세요.
다음 위내시경	정상이면 보통 1~2년 뒤입니다. 가족력·위염·역류·헬리코박터 양성 등이 있으면 간격이 더 짧아질 수 있습니다.

진료시간에는 광교바른내과 ☎ 031-893-4560 으로도 연락하세요.

조직검사나 헬리코박터 신속검사를 하셨다면 →

위내시경 후 주의사항 (조직검사 있음)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — ASGE Guidelines for sedation and anesthesia in GI endoscopy(Gastrointest Endosc 2018) · BSG/ESGE 항혈전제 내시경 지침(Gut 2021)

위내시경 잘 받으셨습니다. 본 안내는 조직검사 없는 위내시경 후 일반 권고로, 기저질환·복용약에 따라 담당 의사의 지시가 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/post-egd-clean/

