

폐기능 검사 — 이렇게 해 주세요

검사 전 준비를 확인하시고, 검사실에서는 선생님 신호에 맞춰 4단계만 천천히 따라 하시면 됩니다.

🔊 검사 한눈에 보기

검사 시간
5~10
분이면 끝나요

크게 부는 횟수
3~8
번 반복합니다

한 번 부는 시간
6초+
끝까지 부세요

코집게
꼭 필요
코로 숨 새면 안 돼요

📅 검사 전 준비 — 이것만 지켜 주세요

피할 것	검사 전 언제부터
담배·전자담배	1시간 전부터 금지
격렬한 운동	1시간 전부터 금지
술	8시간 전부터 금지
가슴·배를 조이는 옷	검사 날은 헐렁한 옷

👤 흡입기 — 의사가 쉬라고 한 약만	쉬는 시간
숨чал 때 뿌리는 속효성 확장제	4~6시간
속효성 항콜린 흡입제	12시간
지속성 확장제(하루 2번 쓰는 약)	24시간
지속성 확장제(하루 1번 쓰는 약)	36시간
지속성 항콜린 흡입제	36~48시간

평소 쓰는 조절약(흡입 스테로이드 등)은 **의사가 따로 말하지 않으면 그대로** 쓰세요. 숨이 많이 차면 참지 말고 흡입기를 쓰신 뒤 **검사실에 알려 주세요**.



코집게 · 입술로 꽉 · 처음부터 힘껏

👤 검사 4단계 — 선생님 신호에 맞춰

STEP 01

자세 잡기

의자에 등을 곧게 펴고 편하게 앉아 주세요.
검사 선생님이 코집게를 끼워 드립니다.

STEP 02

마우스피스 물기

기구를 입에 깊이 넣고 입술로 꽉 무신 뒤,
평소처럼 편하게 3~4번 호흡합니다.

STEP 03

깊이 들이마시기

"들이마시세요" 신호에 가슴이 가득
찰 때까지 한 번에 크게. 어깨가 들쭉여도
괜찮습니다.

STEP 04

힘껏 끝까지 부세요

"부세요!" 하면 처음부터 강하고 빠르게.
멈추지 말고 6초 넘게 끝까지 모든
숨을 내쉽니다.

❓ 호흡 요령 · 검사 중 알려 주세요

정확한 결과를 위한 다섯 가지

마우스피스를 입술로 꽉 — 옆으로 공기가 새면 다시 해야 해요
코집게는 단단히 — 코로 숨이 새면 결과가 낮게 나옵니다
들이마실 땐 가슴이 가득 찰 때까지 — 한 번에 크게 마셔요
내쉴 땐 천천히 X, 처음부터 강하게 O — 풍선 터뜨리듯
"그만" 하실 때까지 — 6초 넘게 멈추지 말고 부세요

⚠️ 아래 증상이 있으면 손을 들어 알려 주세요

어지럽거나 머리가 핑 돌 때
가슴이 답답하거나 아플 때
기침이 멈추지 않거나, 가래에 피가 섞일 때
속이 메스껍거나 식은땀이 날 때
평소보다 숨이 많이 차오를 때 — 잠시 쉬 뒤 다시 해도 괜찮아요

🔊 기도가 좁아진 소견(폐쇄성 패턴)이 보이면 — 기관지확장제 반응검사

- ① 흡입기 약을 스페이서(흡입 보조통)로 4번 나눠 들이마십니다
- ③ 검사 전 흡입기 쉬는 시간은 위 표를 따릅니다(의사 안내에 따름)

- ② 약 15분 기다린 뒤 같은 검사를 한 번 더 합니다
- ④ 두근거림·손 떨림이 잠깐 있을 수 있습니다

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

근거 — ATS/ERS 폐활량검사 표준화 2019 · ERS/ATS 폐기능 해석 2022 · 대한결핵및호흡기학회

함께 보기 — 검사 전 「폐기능검사」 edu.gwanggyobarun.com/decks/pulmo/pft/ · 결과지 받은 뒤 「결과 해석」
edu.gwanggyobarun.com/decks/pulmo/pft-interpretation/

흡입기를 멈출지·얼마나 멈출지는 진료실 안내가 우선입니다. 본 자료는 일반 안내이며 개인 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/respiratory/pulmonary-function-test-prep/



집에서 다시 보기