

# 아침 공복혈당이 높게 나오는 이유와 생활 관리

밤새 아무것도 안 드셨는데 아침 혈당이 높게 나와 당황하셨나요? 우리 몸의 자연스러운 작용인 경우가 많습니다. 왜 그런지, 그리고 무엇부터 바꾸면 도움이 되는지 쉽게 정리했습니다.

## 아침 공복혈당, 왜 높게 나올까요?

### 자연스러운 우리 몸의 작용

**밤새 간이 당을 내보냅니다** — 잠든 동안 에너지가 끊기지 않도록 간이 포도당을 조금씩 만들어 혈액으로 보냅니다.  
**새벽 호르몬이 당을 더 만듭니다** — 새벽에는 잠을 깨우는 호르몬이 나와 간이 당을 더 만듭니다. 이것을 '새벽 현상'이라고 합니다.  
 건강한 사람도 생기지만, **당뇨·전당뇨가 있으면 더 두드러져** 아침 혈당이 높게 나옵니다.

### 흔한 오해

"자기 전 저혈당 반동(소모기 현상) 때문 아닌가요?"  
 밤사이 혈당이 떨어졌다가 다시 크게 튀어 오르는 현상은 **실제로는 매우 드뭅니다.**  
 대부분은 위에서 설명한 **간의 당 생성과 새벽 현상**이 원인입니다. 자기 전에 일부러 더 드실 필요는 없습니다.



## 아침 공복혈당을 올리는 생활 요인

**체중·뱃살** — 복부 지방이 많을수록 혈당 조절이 어려워집니다.  
**늦은 야식·저녁 탄수화물 과다** — 밤늦은 식사가 새벽 혈당을 끌어올립니다.  
**운동 부족** — 근육이 당을 쓰지 못해 혈당이 잘 떨어지지 않습니다.

**수면 부족·코골이** — 잠이 부족하거나 수면무호흡이 있으면 혈당이 올라갑니다.  
**스트레스** — 스트레스 호르몬이 간의 당 생성을 자극합니다.  
**일부 약물** — 스테로이드 등 일부 약은 혈당을 올릴 수 있습니다.

## 이렇게 관리하세요 (효과가 큰 순서)

1. **체중 5~10% 줄이기** — 가장 효과가 큰 한 가지입니다.
2. **저녁 식후 10~20분 걷기** — 식후 혈당과 새벽 혈당을 함께 낮춥니다.
3. **주 150분 이상 운동** — 빠르게 걷기·자전거 등을 꾸준히.

4. **수면 6~8시간** — 코골이가 심하면 수면검사를 상의하세요.
5. **늦은 야식·저녁 탄수화물 줄이기** — 채소·단백질을 먼저 드세요.
6. **식이섬유 늘리기** — 통곡물·채소를 매 끼니에 더합니다.
7. **절주** — 술은 혈당과 수면을 함께 흔듭니다.

## 이럴 때는 진료를 받으세요

갑자기 **살이 빠지면서** 물을 많이 마시고 소변이 잦아질 때  
 공복혈당 **200 mg/dL** 이상이 반복해서 나올 때

**스테로이드 등 혈당 올리는 약**을 복용 중일 때  
 가정에서 **췌관** 혈당이 계속 높게 나올 때

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

본 자료는 일반적인 건강 안내이며 진단·처방을 대신하지 않습니다. 공복혈당 수치 해석과 약물·검사 계획은 개인의 상태에 따라 달라질 수 있으니 담당 의사와 상의하세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → [gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/endocrine/fasting-glucose/](http://gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/endocrine/fasting-glucose/)