# 만성두드러기, 꾸준히 관리하면 나아집니다

만성두드러기 (Chronic Urticaria, CU) 의 원인·진단·단계별 치료를 환자 눈높이로 안내합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 6주 넘게 반복되면 만성두드러기입니다

가렵고 부푼 피부가 자주 나타나며 깊은 부종이 함께 올 수 있습니다

6주

## 반복 기간

부푼 피부와 가려움이 6주 넘게 반복되면 만성으로 봅니다. 피부가 부푸는 자리가 바뀌기도 합니다.

**전염병은 아닙니다**

24시간

## 한 팽진의 변화

개별 부풀음은 보통 하루 안에 사라지고 다른 곳에 다시 생깁니다. 한 자리에 오래 남으면 다시 확인합니다.

**오래 남으면 다시 확인**

## 증상 조절

가려움과 부풀음, 부종을 기록하고 치료 반응을 보며 단계별 치료를 정합니다.

**꾸준한 치료**

입술·혀가 붓거나 숨이 차면 마지막의 응급 신호를 확인하세요.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 저절로 생기거나 자극을 받으면 생깁니다

발생 양상을 기록하면 원인을 좁히는 데 도움이 됩니다

## 자발성 두드러기

특별한 자극 없이 나타나므로 한 가지 음식만 원인으로 단정하지 않습니다.

- 특별한 자극 없이 갑자기 가려운 피부가 부풀어 오름
- 부푼 자리가 바뀌며 왔다가 사라지기를 반복
- 정해진 음식 한 가지에 대한 알레르기와는 다른 경우가 많음

vs

## 유발성 두드러기

찬물·압박·열 같은 특정 자극 뒤에 나타납니다. 어떤 상황에서 생겼는지 적어 두세요.

- 찬 공기나 찬물에 닿은 피부에 가려움과 부풀음이 생김
- 피부를 긁거나 압박받은 자리에 부풀음이 생김
- 운동·열·햇빛 같은 자극 뒤에 증상이 생김

특정 자극이 보이면 날짜와 상황을 적어 오세요.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 피부에서 가려움 물질이 나옵니다

피부의 면역세포가 히스타민을 내보내면 붓고 가렵습니다

### 피부 반응

피부 면역세포에서 히스타민이 나오면 혈관이 넓어지고 물기가 새어 피부가 부풀고 가렵습니다.

### 약이 하는 일

항히스타민제는 히스타민의 작용을 줄여 가려움과 부풀음을 가라앉힙니다. 치료 반응을 보며 약을 조정합니다.

### 꾸준히 복용

증상이 가라앉아도 처방한 기간은 꾸준히 복용합니다. 약을 줄이거나 끊는 시점은 진료에서 상의합니다.




그림 · 피부가 부풀고 가려워지는 과정을 보여 줍니다.

복잡한 면역 검사명보다 증상 양상과 치료 반응이 중요합니다.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 수면과 다른 증상도 함께 이야기하세요

가려움이 생활에 미치는 영향을 진료실에서 살핍니다

## 갑상선 질환

일부에서는 갑상선 문제와 함께 나타날 수 있습니다. 관련 증상과 검사 여부를 진료에서 상의합니다.

## 알레르기 질환

비염·천식·아토피피부염이 함께 있을 수 있습니다. 다른 피부·호흡기 증상도 진료 때 알려 주세요.

## 수면과 마음

가려움 때문에 잠을 못 자거나 불안하면 함께 치료 계획에 반영합니다. 생활에 지장이 있는지도 말해 주세요.

## 다른 전신 증상

열·관절통·체중 변화가 있으면 진료 때 알려 주세요. 두드러기 외의 증상은 다른 원인을 살필 단서입니다.

두드러기가 있다고 모든 분에게 같은 검사가 필요한 것은 아닙니다. 증상 양상과 진찰 결과에 맞춰 정합니다.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 일주일 동안 부풀음과 가려움을 적어 보세요

매일 기록하면 치료가 얼마나 듣는지 비교하기 쉽습니다



그림 · 기록은 증상 변화 확인에 도움이 됩니다.

### 매일 기록

하루 동안 부풀어 오른 곳의 수와 가려움 정도를 적습니다. 매일 같은 방식으로 기록해야 변화를 비교할 수 있습니다.

### 몸의 변화

부풀음이 한 자리에 얼마나 오래 남는지, 입술·눈꺼풀이 붓는지도 적습니다. 깊은 부종이 있다면 함께 알립니다.

### 다음 진료에 가져오기

7일 동안 기록한 내용을 다음 진료에 보여 주면 치료 반응을 살피고 약을 조정하는 데 도움이 됩니다.

점수 계산보다 매일 같은 방식으로 기록하는 것이 중요합니다.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 검사는 증상에 맞춰 선택합니다

광범위한 알레르기 검사가 항상 필요한 것은 아닙니다

### 기본 확인

진찰 뒤 염증·혈액·갑상선 검사 등이 필요한지 판단합니다. 모든 사람에게 같은 검사를 하지는 않으며 증상 양상과 동반 질환을 함께 봅니다.

### 자극이 의심되면

찬물·압박·열처럼 의심되는 자극에 맞춘 검사를 고려합니다. 자극을 받은 뒤의 반응도 함께 설명하세요.

### 오래 조절되지 않으면

증상이 오래 조절되지 않으면 다른 원인을 살피기 위한 검사를 추가할 수 있습니다.



그림 · 증상 양상에 맞는 검사를 고릅니다.

검사 종류는 병력과 진찰 결과에 따라 달라집니다.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

# 치료는 반응을 보며 단계적으로 조정합니다

약을 임의로 늘리거나 끊지 마세요

**1**

## 항히스타민제

기본 치료

처방받은 항히스타민제로 가려움과 피부 부풀음을 조절합니다.

**2**

## 용량 조정

반응 부족

효과가 부족하면 의사가 같은 계열 약의 용량을 조정합니다. 스스로 양을 늘리지는 마세요.

**3**

## 추가 치료

주사 치료

항히스타민제로도 계속 심하면 오말리주맙 등 추가 치료를 상의합니다.

**4**

## 다른 선택

전문 진료

앞선 치료가 어렵거나 듣지 않을 때 전문 진료에서 다음 방법을 정합니다. 처방약을 스스로 중단하거나 바꾸지 마세요.

졸음이 심한 오래된 항히스타민제와 전신 스테로이드의 장기 사용은 권하지 않습니다. 용량·기간은 담당 의사가 정합니다.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 국내에서도 허가된 먹는 표적 치료제가 있습니다

기존 약으로 잘 조절되지 않는 경우의 선택지입니다

### 레미브루티닙

먹는 표적 치료제로, 히스타민이 나오는 과정을 줄입니다. 기존 약으로 조절되지 않는 경우를 대상으로 연구됐습니다.

### 연구 결과

12주 연구에서 약 절반이 잘 조절되는 수준에 도달했습니다. 개인별 반응은 다를 수 있습니다.

### 나에게 맞는지는

국내에서도 허가된 약이지만, 본인에게 적합한지는 진료에서 확인해야 합니다. 기존 치료를 임의로 중단하지 마세요.



그림 · 치료 효과는 개인마다 다릅니다.

새 약이 모든 분의 기존 치료를 대신하는 것은 아닙니다.

근거 · REMIX-1·2 연구, NEJM 2025 · 식약처 허가 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

# 악화 요인을 피하고 약을 꾸준히 드세요

증상을 기록해 본인에게 맞는 관리법을 찾습니다

## 도움 되는 습관

피부 자극을 줄이고 생활 리듬을 지키며, 증상이 달라진 날을 기록합니다.

- 규칙적으로 자고 스트레스를 관리하며 증상과의 관계를 기록
- 무향 보습제를 발라 피부 건조와 자극을 줄이기
- 부푼 곳과 가려움, 그때 받은 자극을 매일 기록
- 피부가 가라앉아도 처방약을 임의로 중단하지 않기

vs

## 주의할 자극

아스피린·이부프로펜 등 소염진통제는 두드러기를 악화시킬 수 있어 피하고, 해열·진통에는 아세트아미노펜을 사용합니다.

- 뜨거운 목욕·사우나
- 과음
- 꽉 끼는 옷과 압박
- 소염진통제 복용 전 의료진과 상의

증거 없이 여러 음식을 한꺼번에 제한하지 마세요.

근거 · 국제 두드러기 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 숨이 차거나 혀가 부으면 즉시 119

단순한 피부 두드러기와 구별해야 하는 응급 신호입니다

### ⚠ 입술·혀·목이 붓기

갑자기 붓고 삼키기 어려우면 즉시 119에 연락하거나 응급실로 갑니다.

### ⚠ 숨참·쌕쌕거림

가만히 있어도 숨쉬기 어렵거나 목소리가 변하면 응급입니다. 즉시 119에 연락하거나 응급실로 갑니다.

### ⚠ 어지럼·의식 변화

식은땀과 어지럼이 심하거나 의식이 흐려지면 즉시 119를 부릅니다. 누워 다리를 올리고 도움을 기다립니다.

### 기다리는 동안

어지럽거나 식은땀이 나면 누워 다리를 올립니다. 숨이 차면 앉아서 구급대원을 기다립니다. 의식이 흐려지면 즉시 119에 알립니다.

호흡 곤란이나 의식 변화가 있으면 직접 운전하지 마세요.

근거 · 세계알레르기기구 아나필락시스 지침 2020

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

## 이 자료의 성격

만성두드러기가 있는 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 치료는 진료에서 함께 결정합니다.

## 참고한 자료

국제 두드러기 진료지침 2022 · 세계알레르기기구 2020

SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요