# 용종절제술 후 주의사항

대장 안 용종을 떼어 낸 자리에는 작은 상처가 남습니다. 며칠 뒤 다시 피가 나는 지연출혈은 드물지만 2주 안에도 생길 수 있어, 아래 기준을 보호자와 함께 확인해 주세요.

## 2주 동안 살펴볼 것 — 피와 통증

| 지켜봐도 됩니다 | 바로 119 또는 응급실로 가세요 |
|---|---|
| • **휴지에 살짝 묻는 피** — 지켜봅니다.<br>• **배가 빵빵함·방귀** — 검사 때 넣은 공기 때문이며 1~2일 안에 좋아집니다. | • **피** — 변기 물이 붉어짐, 검붉은 피나 짜장면처럼 검은 변, 피덩어리<br>• **어지러움** — 식은땀, 쓰러질 것 같음, 얼굴이 창백함<br>• **복통** — 점점 심해짐, 배가 심하게 빵빵함(드물게 장에 구멍이 생긴 신호)<br>• **열·구토·숨참** — 38°C 이상 발열, 오한, 반복 구토, 숨이 참 |

## 먹기·움직이기 — 기간별 기준



떼어 낸 자리는 1~2주에 걸쳐 아뭅니다

| 언제 | 기준 |
|---|---|
| 오늘 | 물부터 마시고 미음·죽·부드러운 음식을 조금씩 드세요. |
| 24시간 | 수면(진정) 뒤 **운전·기계 작업·요리·술·중요한 결정**을 하지 마세요. |
| 1~2일 | 증상이 없으면 부드러운 일반식. 맵고 기름진 음식, 씨앗·견과·질긴 고기는 줄입니다. |
| 2주 | **큰 용종(1cm 넘음)·소작·점막절제술(EMR)**을 했다면 무거운 물건·격한 운동·사우나·장거리·해외여행·술을 피하세요. |

## 약 다시 먹기 — 스스로 판단하지 마세요

| | |
|---|---|
| **피를 묽게 하는 약** | 아스피린·클로피도그렐(플라빅스)·와파린·아픽사반(엘리퀴스)·리바록사반(자렐토) 등은 **진료실에서 적어 드린 날짜대로만** 다시 드세요. |
| 진료실 기입란 | 약 이름 _____ 다시 먹는 날 _____ 월 _____ 일 _____ 시 |
| **날짜가 없거나 이상할 때** | 날짜를 못 받았거나 휴지에 묻는 정도의 피가 있으면 **먹기 전에 전화로 확인**하세요. 위 응급 신호가 있으면 전화를 기다리지 말고 **바로 119·응급실**로 가세요. 심장 스텐트·뇌졸중·심방세동·혈전 병력이 있으면 스스로 끊거나 미루지 마세요. |
| **진통제** | **아세트아미노펜(타이레놀)**을 먼저 드세요. 이부프로펜·나프록센 같은 소염진통제는 의사 지시 전에는 피하세요. |

## 조직검사 결과와 다음 대장내시경

| | |
|---|---|
| 결과 안내 | 떼어 낸 용종은 현미경 검사로 종류와 위험도를 확인합니다. 결과는 **약 1~2주 뒤** 외래 또는 전화로 알려 드립니다. 결과를 받지 못하셨다면 **꼭 병원에 전화해 확인**하세요. |
| **다음 대장내시경** | 용종의 크기·개수·조직 결과로 정합니다. 자세한 기준은 대장용종 결과지 읽는 법을, 진료실 설명 자료는 용종절제술 후 관리 슬라이드를 보세요. |

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560 (진료시간 전화 상담)

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — BSG/ESGE 항혈전제 내시경 지침(Gut 2021) · ACG-CAG 항혈전제 지침(2022) · NHS 용종절제 후 관리 안내

*용종 절제 잘 받으셨습니다. 본 안내는 일반 권고이며 떼어 낸 용종의 크기·개수·복용약에 따라 담당 의사의 지시가 우선합니다.*

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/post-polypectomy/