

철분제 복용 시 주의사항

Iron Supplement — 비타민 C와 함께·공복 복용으로 흡수율을 3~4배 올리고, 차·우유·칼슘·제산제와는 최소 2시간 분리하세요. 페리틴 회복까지 보통 3~6개월이 필요합니다.

한눈에 보는 흡수의 법칙 (Key Absorption Numbers)

공복 복용 시 흡수율

×2~3

식후 대비 (위산 활성 ↑)

비타민 C 동시 복용

×3~4

100~200mg 함께 (오렌지 1개)

차·우유·제산제와 동시

↓50~75%

최소 2시간 분리 권고

치료 기간

3~6

개월 (Hb 정상 후 페리틴까지)



비타민 C와 함께 → 흡수 시너지 (×3~4)



차(탄닌)·우유(칼슘)와 동시 → 흡수 차단 (↓50~75%)

함께 먹으면 좋은 것 vs 피해야 할 것 (Boosters & Blockers)

흡수 부스터 · 함께 드세요

- 비타민 C 식품 — 오렌지·키위·딸기·피망·브로콜리 (100~200mg 권장)
- 공복 복용 — 아침 식전 30~60분이 가장 흡수율 ↑
- 살코기·생선과 곁들이기 — MFP 단백질이 비헴철 흡수 보조
- 오렌지·자몽 주스 1잔 — 산성 환경이 철 환원 (단, 차·커피 X)

흡수 방해 · 최소 2시간 분리

- 차·녹차·홍차·커피 — 탄닌(폴리페놀)이 철과 결합해 흡수 ↓ 60~80%
- 우유·치즈·요거트·칼슘제 — 칼슘이 같은 통로로 경쟁 흡수
- 시리얼·통밀빵·콩 — 피틴산·식이섬유가 철과 결합
- 제산제·PPI·H2 차단제 — 위산 차단 → 철 환원 불가
- 레보티록신·테트라사이클린·퀴놀론 — 약물끼리 결합, 4시간 분리

복용 팁과 즉시 진료가 필요한 경우 (Tips & Red Flags)

복용 팁 · DAILY ROUTINE

- 아침 식전 30분 — 오렌지주스 1잔과 함께 1정
- 위장 불편하면 식후 즉시 — 흡수율은 약간 ↓ 되나 지속 복용이 우선
- 검은 변·치아 변색은 정상 — 복용 중단할 필요 없음
- 변비 시 — 수분 1.5~2L + 자두·감·식이섬유 보충
- 격일 복용도 효과 동등 — 부작용 심하면 주치의와 상의 (최신 연구)

즉시 외래 · CALL CLINIC

- 흑색 타르변 + 어지럼·복통 — 위장관 출혈 의심 (변색과 구별)
- 심한 구역·복통이 1주 이상 — 제형 변경 또는 정맥 철분 고려
- 8주 복용 후 Hb 1g/dL 이상 ↑ 안 됨 — 흡수 장애·만성출혈 재평가
- 임신·수유 중 정량 확인 — 임신 2~3기 권장 30~60mg/일

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: 2021 BSG Iron Deficiency Anemia Guideline · 2024 ACOG Anemia in Pregnancy · 2017 Stoffel et al. (Lancet Haematol — 격일 복용 연구) · KSH 빈혈 진료지침. 본 자료는 일반 안내이며 환자 상태에 따라 처방의 판단이 우선합니다.

QR 대신 입력 → gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/medication/iron-supplement/



집에서 다시 보기