
헬리코박터 제균 치료 안내

이 안내문은 복약 점검용입니다. 치료 설명 슬라이드도 함께 보세요.

왜 치료하나요



30% 한국 성인 감염률 · 10명 중 3명

약 6배 감염 시 위암 위험 · WHO 지정 1군 발암요인

35% ↓ 제균 후 위암 발생 · 궤양 재발도 크게 감소

없애는 것 자체가 치료입니다. 한 번 끝내면 재감염은 **한 해 2~3%** 정도로 드뭅니다.

약 드실 때 꼭 지켜주세요

지킬 것	이렇게 하세요
정해진 시간에 드세요	**처방받은 복용 시간표**를 그대로 따르세요. 흔히 위산 억제제(PPI)는 **식사 30분 전**, 항생제는 **식사 직후**입니다. 매일 같은 시간에 맞추시면 가장 좋습니다.
치료 중에는 술을 드시면 안 됩니다	항생제(메트로니다졸)와 술이 만나면 심하게 두근거리고 토하거나 얼굴이 붉어집니다. **메트로니다졸을 먹는 동안과 마지막 복용 뒤 72시간까지** 금주하세요.
한 알도 거르지 마세요	빠뜨리면 균에 **내성**이 생겨 다음 치료가 훨씬 어려워집니다. 깜빡하셨더라도 다음에 두 배로 드시지 말고 진료실로 연락 주세요.
속이 편해져도 끝까지	증상이 좋아진 것과 균이 없어진 것은 다릅니다. **처방받은 날짜를 다 채우셔야** 제균이 끝납니다.

치료 일정

1 치료 시작
DAY 1
처방대로 복용 시작.
첫날부터 금주

2 복용 끝
동시 10일·삼제 14일
마지막 한 알까지
다 드십니다

3 기다리기
4주 이상
재검사 전 위산약은
2주 중단

4 제균 확인
요소호기검사
균이 남았으면
2차 치료로

부작용 — 이건 괜찮고, 이건 연락 주세요

흔한 반응 · 대개 괜찮습니다

- **메스꺼움 · 입맛 없음** — 식사와 함께 드시면 한결 나아집니다
- **입에서 쇠 맛이 남** — 약을 끊으면 원래대로 돌아옵니다
- **변이 검게 나옴** — 대개 비스무트 때문입니다. 짜장처럼 검고 끈적하거나 어지러우면 응급실로 가세요.
- **가벼운 설사 · 두통** — 보통 며칠 안에 좋아집니다

10명 중 2~3명이 겪지만, 이 때문에 약을 중단하는 경우는 드뭅니다.

이럴 땐 바로 연락 주세요

- **온몸에 발진**이 돋거나 심하게 가려울 때
- **물설사가 하루 6번 이상** 나올 때
- **눈이나 피부가 노랗게** 변할 때

약국에서 지사제를 임의로 사서 드시지 마세요.
먼저 031-893-4560으로 연락 주세요.

이럴 땐 응급실로(119)

숨쉬기 힘들거나 얼굴 · 입술이 부을 때

광교바른내과
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560

근거 — 대한상부위장관·헬리코박터학회 진료지침(2025), 미국 국립의학도서관 메트로니다졸 복약정보(MedlinePlus). 처방 약제와 기간은 환자분마다 다를 수 있습니다.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/h-pylori-eradication/