# 철결핍성 빈혈 식이요법 가이드

철결핍성 빈혈은 철분제만으로는 부족합니다. 헴철 식품, 비타민 C와 함께 먹기, 커피·우유 피하기로 음식 속 철의 흡수를 높이는 식사법을 정리했습니다.

## 한눈에 보는 핵심 수치

| 철이 특히 많은 음식 | 진단 기준 (혈색소) | 하루 권장 섭취 (철분) |
|---|---|---|
| **굴 7mg** | **<12** | **18 / 8** |
| 100g(5~6개) · 하루 권장량의 39% | 여성 g/dL · 남성 <13 | mg · 가임여성 / 남성 |

## 헴철 vs 비헴철 — 흡수율 3배 차이

| 헴철 — 고기·생선 속 철 · 흡수율 15~35% | | | 비헴철 — 채소·콩 속 철 · 흡수율 2~20% | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 식품 | 분량 | 철분 (권장량 대비) | 식품 | 분량 | 철분 (권장량 대비) |
| **굴** | 100g | 7mg (39%) 5~6개 | **검은콩·렌틸콩** | 삶은 100g | 약 3.3mg (18%) ½공기 |
| **간 (소·돼지)** | 50g | 6.2mg (34%) 임신부 주의 | **시금치·근대** | 100g | 2.7mg (15%) 반드시 데쳐서 |
| **바지락·홍합** | 100g | 3~6mg 조개류 | **호박씨·해바라기씨** | 30g | 2.3mg |
| **소고기 안심·등심** | 100g | 2.6mg (14%) 붉은 살코기 | **두부** | ½모 100g | 1.5mg (8%) 단백질 보조 |
| **정어리·고등어** | 100g | 1.5~2.7mg | **검은깨·들깨** | 1큰술 | 1.4mg 요거트 토핑 |
| **닭고기 다리살** | 100g | 1.3mg 가슴살보다 많음 | **달걀 노른자** | 1개 | 1mg (6%) 간편 보충 |
| **돼지고기 안심** | 100g | 1.1mg 지방 적은 부위 | **건자두·건포도** | 30g | 1mg 간식 대체 |

괄호 안 % = 가임기 여성 하루 권장량(18mg) 대비. 철분 함량은 일반적 평균치이며 조리법·품종에 따라 차이가 있습니다.

## 음식 속 철 흡수 — 돕는 것 vs 방해하는 것



철분 식품 + 비타민 C 과일·채소를 한 상에

| 함께 드세요 | 식후 2시간은 피하세요 |
|---|---|
| **비타민 C** — 음식 속 식물성 철(비헴철) 흡수를 돕습니다 (오렌지·키위·딸기·파프리카) | **커피·녹차·홍차 (탄닌)** — 철 흡수를 크게 떨어뜨립니다. 식후 2시간 뒤에 |
| **구연산·유기산** — 식초·레몬즙 곁들이기 | **우유·요거트·치즈 (칼슘)** — 철분과 흡수 경쟁 |
| **고기와 함께 먹기 (육류 인자)** — 채소와 고기를 같이 먹으면 비헴철 흡수 ↑ | **통밀·콩의 피틴산 / 시금치의 옥살산** — 데치기 + 비타민 C로 상쇄 |

## 철분 흡수를 높이는 하루 식단 (철분 약 14mg + 비타민 C 충분)

| 끼니 | 메뉴 | 포인트 |
|---|---|---|
| **아침 · 7~8시** | 잡곡밥 + 소고기 다짐 미역국 1/2공기 + 데친 시금치 + **오렌지주스 100ml** | 비타민 C로 비헴철 흡수 ↑ |
| **점심 · 12~14시** | 현미밥 + 닭다리살 구이 + 검은콩 조림 + 파프리카 샐러드(레몬 드레싱) + 키위 1개 | 헴철 + 비헴철 동시 |
| **저녁 · 18~19시** | 현미밥 + 굴전 또는 바지락 미역국 + 두부조림 + 브로콜리 + 딸기 5개 | 굴 100g ≈ 철분 7mg |
| **간식 · 식간** | 건자두 30g + 호박씨 한 줌 / 또는 요거트 + 검은깨 1큰술 | **커피·녹차는 식후 2시간 후** |

**철분제를 드시는 분께**
철분제 먹는 법(시간·간격·기간)은 「철분제 복용 시 주의사항」 한 장에 모았습니다 —
**edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/iron-supplement/**

진료실 설명 자료 — 철결핍성 빈혈: edu.gwanggyobarun.com/decks/heme/iron-deficiency-anemia/

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한혈액학회 철결핍성 빈혈 진료지침 · 미국혈액학회(ASH) Iron Deficiency Guidelines · 보건복지부 한국인 영양소 섭취기준 (철분 18mg/일 가임여성) · 식약처 영양성분 데이터베이스

*본 자료는 일반적 권고이며, 환자별 상황(임신·만성질환·출혈)에 따라 달라집니다. 동반질환이 있으면 담당의와 상담 후 식이를 정하세요.*

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/iron-deficiency-anemia-diet/