

아이가 자꾸 배가 아파요 검사는 정상인데, 왜 그럴까요?

소아 기능성 복통·과민성 장 증후군 (FAP · IBS) — 약 없이 식사와 생활습관으로 편안해지는
근거 기반 관리

대부분은 위험한 병이 아닙니다

검사에서 이상이 없는 반복성 복통은 대개 '기능성'이며, 시간과 좋은 생활습관으로 대다수가 호전됩니다

90% 이상

반복성 복통으로 병원을 찾은 아이 10명 중 9명 이상은 검사에서 위험한(기질적) 원인이 없는 '기능성'입니다 — 대부분은 식사·생활 관리로 좋아집니다.

WHY REASSURANCE COMES FIRST

소아 기능성 복통(FAP)과 과민성 장 증후군(IRS)은 혈액검사·내시경에서 이상이 보이지 않지만 반복되는 복통을 일으키는 흔한 상태입니다. 장이 망가진 것이 아니라 뇌와 장을 잇는 신경망(뇌-장 축)이 예민해진 것으로, *암이나 염증성 장 질환(IRS)으로 진행하지 않습니다*. 다만 통증이 반복되면 아이의 불안·수면·학교생활이 힘들 수 있어, 잘 이해하고 관리하는 것이 중요합니다.

기능성 복통과 IBS — 뇌-장 축의 문제입니다

검사에 나오지 않는 '진짜' 통증 (Disorders of Gut-Brain Interaction)

장의 신경이 예민해지면, 정상적인 장 운동이나 가스도 뇌에서 **심한 통증**으로 느껴집니다. 이것을 '장이 예민해진 상태(내장 과민성)'라고 합니다.

"예민한 성격"이나 "괴병" 때문이 아니라 의학적으로 입증된 뇌-장 신경의 반응 변화이며, 부모의 잘못도 아닙니다. 스트레스·긴장·불규칙한 생활·수면 부족, 그리고 특정 음식이 통증을 더 자주, 더 세게 만드는 '방아쇠'가 될 수 있습니다. 그래서 장 자체를 고치기보다 식사·생활을 다듬어 뇌-장 축의 과민 반응을 가라앉히는 접근이 더 효과적입니다.



반복되는 복통이 아이에게 남기는 것들

통증 그 자체보다, 아이의 일상과 마음에 미치는 영향이 더 클 수 있습니다

BURDEN · 01

불안 (Anxiety)

"또 아프면 어쩌지" 걱정하며 예민해지고, 배가 아플 만한 상황을 피하려 합니다. 불안은 다시 통증을 키우는 악순환을 만듭니다.

BURDEN · 02

우울감 (Low mood)

하고 싶은 활동을 못 하며 위축되고 기분이 가라앉기 쉽습니다. 통증과 기분은 서로 영향을 주고받습니다.

BURDEN · 03

학교 결석 (School absence)

복통으로 등교를 못 하거나 조퇴가 잦아지면 학습과 교우관계에 영향을 주고, 결석 자체가 불안을 더 키웁니다.

BURDEN · 04

삶의 질 저하 (Reduced QoL)

놀이·식사·여행 등 또래가 누리는 일상 활동이 제한되어, 아이의 전반적인 삶의 질이 떨어집니다.

BURDEN · 05

수면 문제 (Sleep)

잠들기 어렵거나 자다 깨는 일이 늘면 피로가 쌓이고, 피로는 다시 통증에 더 민감하게 만듭니다.

BURDEN · 06

가족의 걱정 (Family burden)

부모의 불안과 잦은 병원 방문·반복 검사가 아이에게도 전해져, 온 가족이 함께 지칩니다.

왜 '먹는 것'과 '생활 리듬'이 중요할까요?

예민한 장은 음식·식사 시간·생활 리듬에 크게 반응합니다 — 약을 늘리기 전에 먼저 다듬을 부분

무엇을·언제·어떻게 먹는지가 통증의 빈도와 세기를 바꿉니다. 특정 음식이 장에서 가스·수분을 늘리거나 장을 자극하면, 예민한 장이 이를 통증으로 증폭합니다.

반대로 규칙적인 식사·충분한 수분·안정된 생활 리듬은 장의 과민 반응을 가라앉힙니다. 그래서 검사가 정상인 소아 복통에서는 약물에 앞서 **식사**와 **생활**을 먼저 조절하는 것이 관리의 기본입니다. 부작용이 없고, 온 가족이 함께 실천할 수 있는 안전한 첫걸음입니다.

우선순위

식사·생활 먼저

약물

최소화

안전성

부작용 없음



도움이 되는 식사 습관 6가지

거창한 식이요법이 아니라, 오늘부터 집에서 바로 실천할 수 있는 기본기입니다

HABIT · 01

규칙적인 식사

아침을 거르지 않고 정해진 시간에 먹습니다. 오래 굶다가 몰아 먹으면 장이 더 예민하게 반응합니다.

HABIT · 02

충분한 수분

물을 자주 마시면 변이 부드러워지고 장 움직임이 편해집니다. 변비형 복통에 특히 도움이 됩니다.

HABIT · 03

적절한 식이섬유

채소·과일·통곡물을 조금씩 늘립니다. 한 번에 많이 늘리면 오히려 가스가 찰 수 있어 천천히 늘려갑니다.

HABIT · 04

천천히·꼭꼭 씹기

급하게 먹으면 공기를 함께 삼켜 배가 더부룩해집니다. 식사 중 TV·스마트폰은 잠시 끄고 여유 있게.

HABIT · 05

균형 잡힌 식단 유지

성장기이므로 무리한 음식 제한은 금물입니다. 특정 음식을 오래 빼기 전엔 반드시 의료진과 상의하세요.

HABIT · 06

유산균·페퍼민트 (선택)

일부 아이에게 도움이 될 수 있으나 효과는 개인차가 큼니다. 시작 전 의료진과 먼저 상의하세요.

배를 더 아프게 할 수 있는 음식 — 줄여보세요

아이마다 방아쇠는 다르지만, 아래 음식들은 예민한 장을 자극하는 흔한 원인입니다

REDUCE · 01

탄산음료 · 사이다

탄산 가스가 배를 부풀려 팽만감과 통증을 유발합니다. 물이나 보리차로 바꿔주세요.

REDUCE · 02

과도한 과일주스 · 단것

과당·소르비톨(무설탕 껌·젤리 포함)이 장에서 가스·설사를 일으킵니다. 주스보다 생과일을 적당히.

REDUCE · 03

카페인

콜라·초콜릿·에너지음료의 카페인 장을 자극하고 잠을 방해해 통증을 키웁니다.

REDUCE · 04

기름지고 튀긴 음식

소화가 느리고 장을 자극해 식후 복통·더부룩함을 잘 일으킵니다. 튀김·패스트푸드는 줄이기.

REDUCE · 05

지나치게 맵고 자극적인 음식

아이마다 다르지만 흔한 방아쇠입니다. 통증이 반복되는 음식은 잠시 줄여 반응을 살펴보세요.

REDUCE · 06

유제품 과다 (해당 시)

유당불내증이 있으면 우유·아이스크림 뒤 복통·설사가 생깁니다. 의심되면 진료 시 확인하세요.

주의 저포드맵(FODMAP) 같은 엄격한 제한식을 아이 스스로 오래 하는 것은 영양과 성장에 해로울 수 있습니다. 필요하다면 반드시 의료진·영양 상담과 함께 짧게 시도하세요.

우리 아이만의 방아쇠 찾기 — 음식·통증 일기

2~4주만 꾸준히 적으면, 반복되는 음식·상황 패턴이 눈에 보입니다

DIARY · 무엇을 적나

음식·통증·배변·기분

먹은 음식과 시간, 통증이 언제·얼마나 아팠는지, 배변 상태, 그날의 스트레스·수면을 짧게 기록합니다.

DIARY · 어떻게 활용

패턴을 함께 해석

반복되는 방아쇠 음식만 '골라서' 줄입니다. 막연한 광범위 제한이 아니라 근거 있는 조절이 목표입니다.

LIFESTYLE · 리듬

규칙적 수면·가벼운 운동

충분한 잠과 매일의 가벼운 활동은 장 리듬을 안정시키고 통증에 대한 예민함을 낮춰줍니다.

LIFESTYLE · 배변

편안한 배변 습관

아침 식후 화장실에 여유 있게 앉는 습관을 들입니다. 변비는 소아 복통의 아주 흔한 원인입니다.

핵심 한두 가지 음식으로 단정 짓기보다, 기록으로 확인된 방아쇠만 줄이고 나머지는 골고루 먹여 성장에 필요한 영양을 지켜주세요.

우리 아이에게 어떻게 적용할까요?

경고 신호(10페이지)가 없다면, 검사·약물에 앞서 식사·생활부터 단계적으로 시도합니다

- 1 **안심과 이해**
의사가 기질적 원인을 배제해 '기능성'으로 확인한 뒤, 위험한 병이 아님을 함께 이해하고 통증·음식 일기로 방아쇠를 관찰합니다.
- 2 **식사 다듬기**
규칙적인 식사·충분한 수분·적정 식이섬유를 지키고, 확인된 방아쇠 음식(탄산·과도한 단것·카페인·기름진 음식)을 줄입니다.
- 3 **생활 리듬**
규칙적 수면·가벼운 운동·등교 유지와 편안한 배변 습관이 기본입니다. 통증에 온 가족이 과도하게 반응하지 않는 것도 중요합니다.
- 4 **안 나아지면? 진료실 연계**
몇 주간 실천해도 나아지지 않거나 경고 증상이 있으면 의사와 상의해 추가 평가·약물·전문 치료로 조정합니다.

안내 우리 아이에게 맞는 식사 조절과 생활 계획은 원내에서 함께 구체적으로 정해 드립니다. 궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요.



이런 신호가 있으면, 식사 조절보다 검사가 먼저입니다

아래 중 하나라도 있으면 기능성으로 단정하지 말고 반드시 추가 평가가 필요합니다



체중 감소 · 성장 지연

다이어트 없이 빠지는 체중, 키·몸무게 성장 곡선의 이탈은 기질적 원인 평가와 정밀 검사가 필요합니다.



혈변 · 야간 통증 · 반복 발열

대변에 피가 섞이거나, 잠을 깨우는 야간 통증·야간 설사, 반복되는 발열은 기능성 복통에서는 드문 경고 신호입니다.



가족력 · 삼킴곤란 · 지속 구토

염증성 장 질환(IBD)·셀리악병 가족력, 삼키기 힘들, 반복되는 구토는 기질적 질환을 시사하므로 검사를 우선합니다.

오늘 꼭 기억할 7가지

소아 기능성 복통·IBS는 이해와 식사·생활 관리로 충분히 좋아집니다

01 아이 앞에서 걱정을 드러내기보다 **"괜찮아질 거야"**라고 안심시켜 주세요

02 기능성 복통·IBS는 **뇌-장 축의 문제** — 궤병도, 부모 잘못도 아닙니다

03 **통증·음식 일기**로 스트레스·식사·수면 등 방아쇠를 함께 찾아봅니다

04 **규칙적 식사·충분한 수분·등교 유지**가 회복의 기본입니다

05 **탄산·과도한 주스나 단것·카페인·기름진 음식**을 줄여보세요

06 성장기이므로 **무리한 제한식은 금물** — 음식을 오래 빼기 전 의료진과 상의하세요

07 **체중감소·혈변·성장지연** 등 경고 증상은 즉시 진료·검사로 확인합니다

대부분 좋아집니다 — 식사와 생활 관리로 더 편안하게

안심과 이해에서 시작해, 아이에게 맞는 식사 조절과 생활 계획을 함께 찾아가겠습니다 — 궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요