


# 전당뇨(Prediabetes) 관해, 심근경색·심부전·사망 위험 절반으로


공복혈당이 97 mg/dL 이하로 회복되면 주요 심혈관 사건과 조기 사망 위험이 약 50% 감소합니다 — Lancet Diabetes & Endocrinology 2026 근거

# 전당뇨, "일단 추적만"의 시대는 끝났습니다


한국 성인 약 30%가 전당뇨 상태이며, 관해 여부가 향후 10년 심혈관 건강을 결정합니다



한국 성인  
전당뇨 유병률



매년 당뇨로  
진행 비율



관해 시 심혈관·  
사망 위험 감소

**새로운 메시지** — 전당뇨를 단순히 "추적 관찰"하는 시대는 지났습니다. 적극적인 생활습관 교정으로 공복혈당을 정상 범위(특히 97 mg/dL 이하)로 회복시키면 심근경색·심부전·조기 사망 위험이 절반으로 줄어듭니다. 이 효과는 연령·체중·인종에 관계없이 일관되게 관찰되었습니다.

# 전당뇨와 관해의 정의

아직 당뇨는 아니지만 정상보다 높은 혈당 상태 — 그리고 정상으로 되돌리는 길

전당뇨 진단 기준 (3가지 중 하나)

- 공복혈당장애 (IFG) — 공복혈당 100~125 mg/dL
- 내당능장애 (IGT) — 75g OGTT 2시간 140~199 mg/dL
- 당화혈색소 (HbA1c) — 5.7~6.4%

관해 목표

≤97mg/dL

공복혈당

또는

<5.7%

HbA1c (당화혈색소)

※ 한 가지만 해당해도 전당뇨로 분류됩니다. 한국인은 정상 BMI라도 인슐린 분비능이 낮아 전당뇨 진행이 빠른 편입니다.

# 전당뇨 발생·진행 위험 요인 6가지

아래 항목이 많을수록 정기 검진 간격을 짧게 가져가야 합니다

## RISK · 01

### 과체중·비만

BMI  $\geq 23$  (아시아인 기준). 특히 복부비만(허리 男  $\geq 90$ ·女  $\geq 85$ cm)이 핵심 인자입니다.

## RISK · 02

### 연령 $\geq 45$ 세

나이가 들면 인슐린 저항성이 증가합니다. 40대 이후 매 3년 공복혈당·HbA1c 검사 권장.

## RISK · 03

### 당뇨 가족력

부모·형제 중 당뇨가 있다면 위험이 2~3배. 한국인은 가족력 양성률이 높은 편입니다.

## RISK · 04

### 신체활동 부족

주 150분 미만의 활동, 좌식 생활. 근육량 감소는 혈당 처리 능력을 직접 떨어뜨립니다.

## RISK · 05

### 고혈압·이상지질혈증

대사증후군 동반 시 위험이 더 큼. TG  $\geq 150$ , HDL 남 <40·여 <50, BP  $\geq 130/85$ .

## RISK · 06

### 임신성 당뇨 과거력

임신성 당뇨를 겪었던 여성은 평생 당뇨 발생 위험이 7~10배. 매년 검사 권고됩니다.



# 핵심 연구 결과 — 관해 시 위험비(HR)

미국 DPPOS + 중국 DaQingDPOS 통합 분석 (N=2,402, 평균 추적 16년)

결과 (Outcome) HR 의미

심부전 입원 **0.44** 관해 시 위험 56% ↓ — 가장 큰 효과

심혈관 사망 + 심부전 입원 **0.53** 복합 결과 47% ↓ — 주요 1차 평가변수

MACE (주요 심혈관 사건) **0.56** 심근경색·뇌졸중·심혈관사망 합쳐 44% ↓

심혈관 사망 **0.58** 42% ↓ — 통계적으로 유의

전체 사망 (All-cause) **0.59** 조기 사망 41% ↓ — 연령·인종 무관

# 공복혈당 97 mg/dL의 의미

단순한 컷오프가 아니라 진료실에서 환자에게 명확히 제시할 수 있는 동기부여 지표

## 왜 97 mg/dL인가?

- **일관된 효과** — 미국·중국 두 집단 모두에서 동일한 위험 감소 관찰
- **연령·체중·인종 무관** — 70대 노인·정상 체중·동양인에서도 적용
- **식이·운동 ROI 명확** — 환자 동기부여·교육 도구로 활용 가능
- **1차 진료 친화적** — 공복혈당 1회 측정만으로 평가 가능

※ 100 mg/dL 미만이면 "정상"으로 분류되지만, 97 mg/dL 이하가 심혈관 보호 효과의 임상적 임계점입니다.

목표 공복혈당


≤97mg/dL

심혈관 보호 임계

전당뇨 분류 기준

100-125mg/dL

공복혈당장애 (IFG)



# 관해를 달성하는 4가지 핵심 축

DPP·Look AHEAD·DaQing 연구가 공통으로 증명한 검증된 개입

## PILLAR · 01

### 체중 5~7% 감량

현재 체중의 5~7%를 줄이는 것이 가장 강력한 단일 인자입니다. 70 kg 환자 = 3.5~5 kg 감량 목표.

## PILLAR · 02

### 유산소 운동 주 150분

중강도 (빠르게 걷기·자전거) 주 150분 + 근력 운동 주 2회. 식후 10~15분 걷기는 즉시 효과.

## PILLAR · 03

### 저당·고섬유 식이

정제 탄수·당분 줄이고 채소·통곡물·생선·콩·견과 늘리기. 지중해식·DASH 식단 효과 입증.

## PILLAR · 04

### 금연·절주·수면

금연은 인슐린 저항성을 직접 개선. 하루 7시간 수면, 음주는 주 2~3회·1잔 이내로 제한.



# 관해까지의 일정 — 단계별 기대 효과

변화는 1개월부터 시작되며, 6~12개월에 의미 있는 관해 가능성이 30~40%에 도달합니다





# 식이 권장 사항 6가지

단순 칼로리 제한보다 "무엇을 먹는가"의 질이 더 중요합니다

## DIET · 01

### 통곡물 우선

현미·귀리·통밀빵·잡곡밥. 흰쌀·흰빵·국수  
비중 절반 이하로.

## DIET · 02

### 채소 하루 5색

색깔별 다양하게 — 매끼 접시의 절반은  
채소로. 식이섬유 25g/일.

## DIET · 03

### 양질의 단백질

생선·콩·두부·계란·살코기. 가공육·  
붉은고기는 주 2회 이하.

## DIET · 04

### 견과류 한 줌

하루 30g (호두·아몬드·캐슈). 무염·  
무가당. 간식 대용.

## DIET · 05


### 물·차 충분히

하루 1.5~2L. 음료·주스·믹스커피는  
당분 폭탄 — 끓거나 무가당으로.

## DIET · 06

### 정제 당류 피하기

설탕·시럽·과자·빵류. 디저트·야식은 주  
1회 의식적 선택으로.



# 진료 즉시 필요한 위험 신호 6가지

아래 증상은 당뇨로 이미 진행했거나 합병증이 시작된 신호일 수 있습니다

## RED FLAG · 01

### жа은 갈증·다음다갈

평소보다 물을 자주 찾고 입이 자주 마른다면 혈당이 급격히 올랐을 수 있습니다.

## RED FLAG · 02

### жа은 배뇨·야뇨

밤에 2회 이상 깨서 화장실. 신장이 고혈당을 배출하는 보상 반응입니다.

## RED FLAG · 03

### 의도하지 않은 체중 감소

식이·운동 변화 없이 한 달에 2~3 kg 이상 감소. 즉시 평가 필요.

## RED FLAG · 04

### 시야 흐림·복시

고혈당으로 수정체가 부어 굴절이 변하거나 망막병증 초기 신호일 수 있습니다.

## RED FLAG · 05

### 손발 저림·감각 저하

말초 신경병증의 초기 증상. 양말 신은 듯한 감각, 발끝부터 시작됩니다.

## RED FLAG · 06

### 상처 회복 지연·감염

발의 작은 상처가 2주 이상 낫지 않거나 반복 감염. 당뇨발의 시작 신호.

# 환자 실천 체크리스트 7가지

오늘부터 시작할 수 있는 구체적 행동 — 작은 변화가 1년 후 큰 결과로

## 01 매주 1회 공복혈당 측정

동일 시간(아침 식전)에 측정·기록. 가정용 혈당계 또는 클리닉 방문 활용.

## 02 주 150분 빠르게 걷기

하루 30분 × 5일 또는 50분 × 3일. 식후 10~15분 걷기 더하면 효과 배가.

## 03 주 2회 근력 운동

홈트·스쿼트·플랭크·아령. 근육량이 늘면 혈당 처리 능력이 직접 올라갑니다.

## 04 체중 5~7% 감량 목표

6개월 목표 — 70 kg → 65~66 kg. 매주 동일 시간 측정해 추세 관리.

## 05 정제 탄수·단 음료 줄이기

흰쌀 → 잡곡밥, 음료수 → 물·차. 한 번에 다 끊지 말고 절반씩 단계적으로.

## 06 야식·과식 피하기

저녁 8시 이후 음식 줄이고 7~8시간 공복 유지. 잠자기 3시간 전 식사 마치고.

## 07 3~6개월마다 클리닉 재검

공복혈당·HbA1c·체중·혈압 추적. 진행 시 약물 치료 시기 함께 논의.

# 전당뇨는 되돌릴 수 있습니다 오늘의 작은 변화 — 1년 후 절반의 위험

검사 결과와 생활습관 계획을 함께 점검합니다 — 궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요

PHONE

**031-893-4560**

ADDRESS

경기 용인 수지구  
광교중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30  
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요