

# 속이 불편하면 식사법부터 조정

오심, 더부룩함, 변비, 설사는 흔하지만 방치하면 탈수와 치료 중단으로 이어질 수 있습니다. 증상별 대응법을 미리 정합니다.

# 가장 흔한 불편감은 위장관에서 옵니다

대부분은 시간이 지나며 줄지만, 심한 증상은 증량 속도와 식사법을 다시 봐야 합니다.

오심·구토·설사·변비는 약 자체뿐 아니라 과식, 기름진 음식, 식사 속도, 수분 부족과 함께 생깁니다. 원인을 나눠 보면 조절할 수 있습니다.

## NAUSEA

### 오심

소량씩, 기름기 줄이기, 식사 후 바로 눕지 않기.

## CONSTIPATION

### 변비

수분, 섬유질, 걷기, 필요 시 진료 후 약 조정.

## DIARRHEA

### 설사


탈수 신호를 보고, 지속되면 진료에 알립니다.



위장관 증상 관리

# 양보다 속도가 먼저입니다

빨리 먹으면 포만감이 늦게 따라와 과식하고, 이후 더부룩함이 오래 갑니다.



한 번에 많이 먹기보다 작은 양을 천천히 먹습니다. 속이 불편한 날은 담백한 단백질과 부드러운 채소부터 시작합니다.

SMALL

**소량**

평소의 1/2-2/3부터 시작해 불편감에 맞춥니다.

SLOW

**천천히**

15-20분 이상, 한 입마다 잠깐 멈춥니다.

LIGHT

**담백하게**

튀김·크림·매운 음식·야식은 증상이 안정될 때까지 줄입니다.

# 변비는 물·섬유질·활동량이 같이 움직입니다

식사량이 줄면 대변량도 줄어 변비가 더 잘 생깁니다.

변비 대처는 한 가지가 아니라 조합입니다. 물만 마시고 움직이지 않거나, 섬유질만 늘리고 물이 부족하면 더 불편할 수 있습니다.

## WATER

### 수분

소변 색이 진하고 어지러우면 부족 신호일 수 있습니다.

## FIBER


### 섬유질

채소·해조류·콩류를 천천히 늘립니다.

## MOVE

### 활동


식후 10분 걷기는 장운동에도 도움이 됩니다.



걷기와 수분

# 이 증상은 참지 말고 연락해야 합니다

췌장염, 담낭질환, 탈수, 신장 문제는 드물지만 놓치면 안 됩니다.



위험 신호

가벼운 오심과 달리 **지속되는 심한 복통**, 반복 구토, 탈수, 황달, 발열은 바로 진료가 필요합니다.

## RED FLAG

### 심한 복통

등으로 퍼지는 상복부 통증, 지속 구토가 있으면 즉시 연락합니다.

## DEHYDRATION

### 탈수

소변 감소, 어지럼, 심한 무기력은 수액·검사 평가가 필요할 수 있습니다.

## GALLBLADDER

### 담낭 증상

우상복부 통증, 발열, 황달은 담낭 문제를 확인해야 합니다.

## 이번 회차는 작게, 천천히, 촉촉하게

이번 주는 증상 일지를 쓰고, 식사량보다 수분과 식사 속도를 먼저 조절합니다.

**01** 오심·변비는 흔하지만 **조절 가능한 신호**입니다.

**02** 작게 먹고 천천히 먹는 것이 첫 번째 처방입니다.

**03** 수분·섬유질·걷기는 변비 관리의 세트입니다.

**04** 심한 복통·반복 구토·탈수는 바로 병원에 연락합니다.

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구  
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과  
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요