

폐렴구균 백신, 왜 맞아야 하나요?

폐렴구균은 **폐렴·패혈증·수막염**을 일으키는 흔한 세균입니다. 폐렴은 국내 사망원인 상위이며, **고령·만성질환·면역저하**가 있으면 특히 위험합니다. 백신 **1~2회 접종**으로 중증 폐렴구균 감염을 효과적으로 예방할 수 있습니다.

어떤 백신이 있나요? 숫자 = 예방하는 균 종류(혈청형)

13

PCV13
공급중단

15

PCV15

20

PCV20

21

PCV21
원내 보유

23

PPSV23
국가무료(65세+)

PCV15·20·21은 **단백결합백신**(면역기억이 오래감), PPSV23은 **다당질백신**(가장 넓은 범위, 5년쯤 후 효과가 감소). PCV13은 공급이 중단되어 과거 접종하신 분의 참고용입니다.

국내 성인 침습성 폐렴구균 질환(IPD) 커버 범위

PCV15		약 36%
PCV20		약 54%
PPSV23		약 59%
PCV21		약 80% ↑

* 커버율은 혈청형 분포에 따른 추정치이며, 실제 예방효과와 완전히 같지는 않습니다. PCV21 커버율은 미국 자료 기준.

누가 맞아야 하나요?



65세 이상

건강해도 1순위 접종 대상



19~64세 만성질환

심장·폐·간질환, 당뇨, 흡연, 알코올
(고혈압 단독은 제외)

면역저하·고위험

무비증, 신부전, 혈액암/고형암, HIV, 이식,
면역억제제, CSF누출, 인공와우

국가 무료 접종 vs 최신 임상 권고 — 나뉘어 있습니다

국가 무료(NIP)는 만 65세 이상, PPSV23 1회입니다(보건소·지정의료기관). 다만 **최신 학회 임상 권고**는 PCV20 또는 PCV21 1회(또는 PCV15+PPSV23)로, 더 넓고 오래가는 예방을 위해 자비 접종을 함께 고려할 수 있습니다. 어떤 선택이 맞는지 진료 시 상담해 드립니다.



기본 3가지 방법

세 가지 모두 동등 · 1회 접종이 편리

방법 1

PCV21 1회

1회로 완료 추가접종 불필요

방법 2

PCV20 1회


1회로 완료 추가접종 불필요

방법 3 · 순차

PCV15 → PPSV23

간격: 면역정상 1년 / 면역저하·CSF·인공와우
8주 · PPSV23은 65세+면 무료 활용

접종 순서 그림



대상별 권장 (처음 맞는 경우)

대상	권장 (셋 중 택1)	순차 시 간격
65세 이상 (건강)	PCV21 또는 PCV20 1회 / PCV15→PPSV23	1년
19~64세 만성질환	PCV21 또는 PCV20 1회 / PCV15→PPSV23	1년
면역저하·CSF누출·인공와우	PCV21 또는 PCV20 1회 / PCV15→PPSV23	8주

면역저하가 있으신 분은 PPSV23 경로 선택 시 추가 접종 규칙이 더 있을 수 있어 **개별 상담**으로 정합니다. · 만 65세 미만 건강한 성인은 국내에서 정기 권장 대상이 아닙니다(미국은 50세부터 권장 — 국내와 차이).

과거에 폐렴 주사를 맞으셨다면 (추가 접종)

과거 접종	이번에	간격
PPSV23만 맞음	PCV21 또는 PCV20 1회	1년 후
과거 PCV13만 맞음	PCV21 또는 PCV20 1회	1년 후
PCV20 또는 PCV21 완료	추가 접종 불필요	—

접종 이력이 복잡하면 진료 시 기록을 확인해 개별적으로 안내해 드립니다.

전문 프로토콜(별도): 조혈모세포이식(HSCT) 환자는 이식 후 재접종 등 별도 일정으로 진행하며 담당 전문의와 상의합니다.

비용 안내

백신	광고바른내과 접종가
PCV15 (박스뉴반스)	13만원
PCV20 (프리베나20)	14만원
PCV21 (캡박시브)	14만원
PPSV23 (프로디악스)	만 65세 이상 국가 무료(NIP) · 그 외 자비 6만원



모바일로 보기