
ADHD 약, 생활의 변화와 함께 재평가합니다

특정 나이가 되면 모두 약을 끊는 것은 아닙니다. 증상·생활 기능·약의 효과와 불편함을 함께 살펴 치료를 이어가거나 조정합니다.

효과·필요성을 살피며 치료를 조정합니다



효과·필요성과 생활 환경을 정기적으로 재평가해 치료 지속 또는 조정을 논의합니다.

평생 먹나요, 끊을 수도 있나요

살필 내용	내용과 행동
강의의 재평가 설명	보통 1년마다 효과·필요성을 종합 재평가한다고 소개했습니다. 효과가 뚜렷하면 지속하고, 호전·안정되면 감량·중단을 시도하는 흐름입니다.
성인기에는	연자 Q&A: 성인은 작용시간이 긴 콘서타를 가장 많이 쓰며, 효과를 크게 본 분들은 신경전달물질 불균형·실행기능 저하가 만성화된 경우가 많다고 답했습니다.
생활의 요구도 함께	성인기에는 업무 수행·시간 관리·대인관계의 요구가 더 복잡해집니다. 자연적인 뇌 발달로 저절로 약을 끊는 시기를 기대하기는 어렵다고 설명했습니다.

약의 도움 없이 생활을 관리할 수 있는지 봅니다

연자 Q&A에서는 인지치료와 달력·알람·업무 분할 같은 생활 조정으로 일상을 체계적으로 관리할 수 있거나, 주의집중력이 덜 필요한 업무·환경으로 바뀌면 약물을 중단할 수도 있다고 답했습니다. 진료에서 이런 변화와 치료 계획을 함께 상의하세요.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

아산 28회 연수강좌 — 소아 ADHD 진단과 치료의 최신 지견(김효원)

개인의 상태와 치료에 따라 안내가 달라질 수 있습니다. 담당 의료진과 상의하세요.

ADHD 약, 생활의 변화와 함께 재평가합니다

증상과 생활 기능의 범위에 따라 경과 설명이 달라집니다. 재평가 때 나의 변화를 함께 살핍니다.

성인기 경과를 설명한 수치의 뜻

살필 내용	내용과 행동
강의의 15~20%	소아 ADHD에서 성인기까지 "뚜렷한 증상"이 지속되는 비율로 소개했습니다. 과잉행동·충동성은 줄어도 부주의는 오래 남을 수 있습니다.
Q&A의 약 90%	연자가 인용한 MTA 추적연구에서 성인기에 "부분적이거나 완전한 증상 및 기능적 어려움"을 겪는 비율입니다. 앞의 수치와 관찰 범위가 다릅니다.
치료 후 발달에 대한 답변	연자는 약물치료가 전두엽 발달이 또래와 비슷해지는 시기를 앞당기고 학습·관계에도 도움이 된다고 설명했습니다. 성인 ADHD로 남는 비율이 더 낮아질 것이라는 답변은 연자의 견해입니다. 개인의 최종 발달 정도는 기저 증상·치료·학습 도움 시작 시기 등에 따라 달라 예측하기 어렵다고 답했습니다.

키·체중과 약의 불편함도 함께 봅니다

강의에서는 초기 식욕저하로 성장 속도가 일시적으로 느려질 수 있으나 개인차가 크고 약 3년차에 회복세를 보이며, 최종 성인 신장은 대체로 정상 범위라고 소개했습니다. 키·체중을 기록하고 식욕저하가 두드러지면 용량 조절·약 변경 등을 상의합니다.

재평가 때 가져갈 생활 기록

1. 약을 먹었을 때 주의집중·시간 관리·대인관계·업무가 어떻게 달라지는지 정리하세요.
2. 식욕·수면·두통·복통 등 불편함, 인지치료·일정 관리의 도움, 업무나 환경의 변화를 함께 이야기하세요.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

아산 28회 연수강좌 — 소아 ADHD 진단과 치료의 최신 지견(김효원)

개인의 상태와 치료에 따라 안내가 달라질 수 있습니다. 담당 의료진과 상의하세요.

집에서 다시 보기