성장기 운동선수의 요통

척추분리증(spondylolysis)의 협부 결손과 자연 경과

성장기·운동선수의 요통에서 협부(pars interarticularis) 결손을 생각한다. 반복적인 신전·회전은 피로골절(stress fracture)과 연결된다.

핵심 판단의 흐름



누구에게 생기는가

항목	교재·강의 내용
정의·위험 양상	Pars interarticularis defect. 체조처럼 신전과 회전을 반복하는 운동선수에서 더 흔하다.
성별	남자가 여자보다 2–3배 흔하다.
연령별 빈도	출생 시 0%, 5–7세 5%, 18세 6–7%로 제시했다. 성장기에 발생할 수 있다.

영상과 경과를 연결한다

항목	강의의 진료 포인트
단순 X-ray	협부가 끊어진 소견으로 진단할 수 있어 개원가에서 진단 후 의뢰하는 경우가 있다.
통증 경과	결손이 그대로 남아도 통증이 저절로 좋아질 수 있다.
전방전위증	교재는 진행 43–74%, 대개 경도 전위(Gr 1–2)로 제시한다. 경우에 따라 수술이 동반된다.

진료실에서 기억할 점

협부 결손 자체와 전방전위증으로의 진행을 구분해 설명한다. 운동 양상·성장기 여부·X-ray 소견을 정리해 전문 진료로 연결한다.