항암 후 손발 저림: 통증 조절과 낙상·화상 예방

항암제 때문에 손발 끝이 저리고 아픈 것을 항암제 유발 말초신경병증(CIPN)이라고 합니다. 통증은 약으로 줄일 수 있지만 저림·무감각 자체는 약 효과가 제한적이어서, 안전하게 지내는 방법을 함께 익히는 것이 핵심입니다.

이런 증상으로 나타납니다



양쪽 손끝·발끝에서 대칭으로 시작합니다

말초신경병증(CIPN)이란

주로 **왼쪽·오른쪽 대칭으로 손끝과 발끝**에서 시작하는 **감각의 이상**입니다. 저림, 이상한 감각(이상감각), 통증이 나타납니다. 환자분들은 이렇게 표현하십니다.

- 손발이 차갑다
- 손발이 뜨겁다
- 운동화 안에 모래 같은 것이 들어 있다
- 장판을 깔아 놓은 것 같다

몸의 위치를 느끼는 감각(고유감각)까지 영향을 받으면 **걷기가 불안정해져 낙상**에 주의해야 합니다. 단추 채우기·걷기가 어렵거나, 일어설 때 어지럽거나, 변비가 생기는 경우도 있습니다.

손발 피부에 물집이 생기고 벗겨지는 '손발증후군'은 다른 부작용으로, 보습이 중요합니다.

원인이 되는 항암제와 경과

약제군	대표 약	특징
탁산(Taxane)	파클리탁셀 · 도세탁셀	유방·폐·위·난소암에서 흔하며 **손발 끝 저림**, 관절·근육통이 함께 올 수 있습니다
백금계	옥살리플라틴 · 시스플라틴 · 카보플라틴	옥살리플라틴은 **찬 자극으로 생기는 급성 이상감각**과 쌓이는 만성 신경병증이 있습니다
빈카알칼로이드	빈크리스틴 · 빈블라스틴	운동신경·자율신경까지 영향을 줄 수 있어 변비가 동반될 수 있습니다
그 밖의 약	에리불린(유방암) · 보르테조밉(다발골수종)	엔포투맙 베도틴 같은 항체-약물 접합체의 MMAE 성분도 주요 원인입니다

약이 **쌓인 양(누적 용량)**에 비례해 생기고, 회복까지 **수개월~2년**이 걸립니다. 백금계·탁산 치료 후 4~5년이 지나도 남아 있는 분들이 있습니다.

먼저 기억할 3가지

1 예방 약은 아직 없습니다
수많은 연구가 있었지만 예방에 효과가 입증된 약은 없습니다. **비타민·가바펜틴을 미리 먹는 것은 권하지 않습니다.**

2 통증은 치료할 수 있습니다
증상이 나타나면 치료합니다. 통증이 있는 경우 **가장 근거가 확립된 약은 둘록세틴**입니다.

3 저림 자체는 약 효과가 제한적
무감각·저림은 약으로 크게 좋아지지 않을 수 있어 **기대치를 맞추고 안전 교육**을 받는 것이 핵심입니다.

항암 담당 의사에게 알려야 할 때

- **일상 기능을 해치는** 중등도 이상의 신경병증으로 진행했을 때
- **빠르게 나빠지거나**, 근력이 떨어지는 증상(운동신경 침범)이 함께 생길 때
- 항암제를 줄이거나 미루거나 중단하는 상의가 필요한 시점일 때
- 약을 써도 **통증이 조절되지 않을 때**

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

뒷면에 통증을 줄이는 약, 낙상·화상·상처 안전, 응급 신호가 이어집니다.

통증을 줄이는 방법 — 약과 약 아닌 방법

방법	어떻게	알아둘 점
둘록세틴 (Duloxetine)	**30mg으로 시작**, 어지럼이 없고 증상이 좋아지면 **60mg까지** 올릴 수 있습니다	통증이 있는 경우 **1차로 가장 권하는 약**입니다. 먹는 동안 **오심·어지럼**에 주의가 필요합니다
가바펜틴 · 프레가발린 (Gabapentin·Pregabalin)	조금씩 천천히 올립니다	1차 약이 듣지 않거나 맞지 않을 때의 대안입니다. **졸림·어지럼이 있어 낙상에 주의**합니다
삼환계 항우울제	저용량을 밤에 복용합니다	노인, 심장질환이 있는 경우, 입마름 같은 항콜린 부작용에 주의합니다
바르는 약·패치	리도카인 패치 · 멘톨 제제 (캡사이신 패치 포함)	아픈 부위에 국소적으로 보조해서 씁니다
약 아닌 방법	운동 · 물리치료 · 낙상 예방	연자는 **운동을 지속적으로 하면 증상이 좋아지고 삶의 질도 좋아진다**고 설명했습니다

낙상·화상·상처 — 안전하게 지내기

걸음 — 낙상

- 몸의 위치 감각이 둔해지면 **걸음이 불안정**해집니다
- 진료에서 **걸음 균형·낙상 위험**과 손의 미세한 동작(단추 채우기)을 살핍니다
- 운동·물리치료와 **낙상 예방·보행 안전 교육**으로 기능을 지킵니다

피부 — 화상·상처

- 손발 감각이 둔해져 **화상이나 상처를 느끼지 못할 수** 있습니다
- 다친 줄 모르고 지나치기 쉬우니 **발 관리 교육**을 진료에서 받으세요
- 옥살리플라틴은 찬 자극에 이상감각이 생기는 약입니다

약 — 어지럼·졸림

- 가바펜틴·프레가발린은 **졸림·어지럼**으로 넘어질 수 있습니다
- 둘록세틴은 **오심·어지럼**에 주의합니다
- 둘록세틴은 어지럼이 없는지 살피면서 30mg에서 60mg으로 올립니다

이럴 때는 바로 응급실로

- 갑자기 **다리 힘이 빠져 걷기 힘들어지거나** 다리 감각이 떨어질 때
- **소변·대변이 조절되지 않을 때** (요실금·변실금)
- 저림과 함께 배뇨·배변 장애가 동반되면 척수 전이·압박일 수 있어 **시간이 아주 중요한 응급**입니다

저림이 항암제 때문만은 아닐 수도 있습니다

의사는 다른 원인도 함께 살핍니다. 마지막 항암 시점과 증상이 시작된 때, 항암제의 종류·누적 용량도 알려 주세요.

- 당뇨병성 말초신경병증 · 비타민 B12 결핍 · 갑상선기능저하증
- 알코올·다른 약·신장질환
- 척추협착·신경근병증 — 한쪽만 약해지거나 근력이 떨어질 때 의심

항암이 끝난 뒤에도

백금계나 탁산 항암제는 치료가 끝나고 **4~5년이 지나서도 말초신경병증이 남아 있는 경우**가 있습니다. 항암 치료 후 건강 관리에서도 증상을 묻는 진료와 **낙상 예방 교육**을 이어갑니다. 이전에 어떤 암으로 어떤 항암 치료를 받았는지 진료 때 알려 주세요.

다른 병원에 가실 때

연자의 병원에서는 항암 치료 약을 바꾸는 경우 **소견서**를 작성해 환자에게 드립니다. 다른 병원에 가실 때는 이 소견서를 **꼭 지참**하도록 안내한다고 했습니다. 어떤 약을 언제까지, 얼마나 받으셨는지(누적 용량)가 신경병증을 살필 때 중요한 정보입니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

아산 28회 연수강좌 — 암 환자가 우리 병원에 왔을 때: 개원의를 위한 증상 관리 가이드(정재호)

본 자료는 항암 치료 후 손발 저림 관리를 위한 일반 안내입니다. 약의 종류·용량은 처방전과 담당 의료진의 안내를 따르시고, 궁금한 점은 진료 때 물어보세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/oncology/asl28-chemo-neuropathy-safety/