폐결절, 이전 CT와 다음 검사일이 중요해요

폐결절은 CT에 보이는 작은 병변을 말합니다. 처음 보였다는 이유만으로 암으로 확정하지 않고 성상·크기·변화를 함께 봅니다.

고형·부분고형·간유리결절을 구분합니다



고형
전체가 진함

부분고형
흐린 부분 + 진한 부분

순수 간유리
전체가 흐림

고형은 전체가 진하고, 부분고형은 흐린 부분 안에 진한 부분이 있으며, 순수 간유리는 전체가 흐리게 보이는 결절입니다.

결과지와 함께 준비하세요

1. 최근 5년 이내 이전 CT가 있으면 가져옵니다. 새로 생겼는지, 크기가 변했는지 비교하는 데 중요합니다.
2. 결절 종류, 크기(mm), Lung-RADS 범주를 결과지에서 함께 봅니다.
3. 다음 검사 날짜와 장소를 적습니다. 정기 검진 일정과 이번 결절의 추적 검사일이 같은지 구분해 둡니다.

Lung-RADS 결과의 기본 일정

범주 1·2	이상 소견 없음·양성 결절: 12개월 뒤 연례 검진 CT 또는 1년 뒤 정기 검진
범주 3	경계성 결절: 교재 표에서는 6개월 뒤 추적 검사
범주 4A	폐암 의심: 교재 표에서는 3개월 뒤 추적 검사
범주 4B·4X	폐암 가능성이 높아 추가 검사를 진행하는 범주

"1년 뒤 다시"는 곧 암이라는 뜻이 아닙니다

연자 Q&A에서는 양성으로 보이는 결절도 크기에 따라 1년 뒤 추적할 수 있다고 설명했습니다. 모양과 크기의 변화, 필요한 조직검사 등을 종합해 판단합니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

결절 종류에 따라 다음 단계가 달라져요

아래는 강의의 결절 종류별 추적 설명입니다. 내 CT의 전체 소견을 반영한 실제 예약일은 진료에서 정합니다.

강의에서 설명한 종류별 추적

고형결절	8mm 미만이면 6개월 이상 간격으로 추적을 설명했습니다. 8mm 이상은 3개월 추적 뒤 증가 여부를 보고 조직검사·PET/CT·수술 등을 검토합니다.
부분고형결절	3개월 뒤 추적합니다. 진한 고형 부분이 8mm 이상이면 수술 또는 조직검사를 위한 전문 진료를 고려합니다. 그보다 작으면 6개월·12개월 추적을 설명했습니다.
순수 간유리결절	3개월 뒤 추적해 소실 여부를 봅니다. 지속되고 15mm 미만이면 6개월 뒤, 이어 1년 간격으로 봅니다. 15mm 이상이면 수술 또는 조직검사 여부를 상의합니다.

크기뿐 아니라 모양과 변화도 봅니다

결절 속 중심성·전체·층상·팝콘 모양 석회화나 지방은 양성 가능성을 시사합니다. 반대로 자라거나 고형 부분이 생기고 늘면 더 적극적인 평가를 고려합니다. 스스로 모양을 보고 추적을 끝내지 않습니다. 여러 결절이 있으면 가장 의심되는 결절을 중심으로 계획합니다.

내 다음 검사 계획

1. 결절 종류·크기: _____
2. Lung-RADS 범주: _____
3. 다음 검사일·병원: _____
4. 이전 CT 보관 위치: _____

흉부 X선이 정상이어도 CT 추적은 별개입니다

연자 Q&A에서는 흉부 X선에 결절이 보이지 않는 경우가 많다고 설명했습니다. CT에서 정한 결절 추적을 X선 결과만으로 대신하지 않습니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/respiratory/asl28-lung-nodule-next-scan/