지속되는 목 이물감: 역류·이비인후과·기능성 원인 평가

가슴쓰림이 호전돼도 목 이물감이 남으면, 주증상과 기존 치료 반응을 다시 나누어 본다.

핵심 판단 한눈에



역류 연관성과 식도 과민성을 구분하고, 지속되는 globus는 이비인후과 평가로 연결한다.

증상과 객관적 역류 소견을 구분

확인 항목	강의의 구분
주증상	전형적: 가슴쓰림·신물역류 / 식도외: 인후 이물감·쉰 목소리·만성 기침 등
불응성 가슴쓰림	24시간 산도검사로 비정상 산 노출, 역류 과민성(RH), 기능성 가슴쓰림(FH)을 구분
기능성·과민성	정상 산 노출에서 증상-역류 연관성 (+): RH / 연관성 (−): FH
인후·후두 증상	전형적인 GERD 증상 동반 여부를 살핀다. 후두 증상에 대한 PPI 반응은 좋지 않을 수 있음

연자 Q&A 47쪽 · 치료 후에도 남는 globus

PPI/P-CAB·위장운동촉진제·신경조절제 이후 지속

이비인후과(ENT) 진료를 권유한다. Gabapentin 300mg 하루 3회에서 약 66% 호전 보고를 소개했다. 이는 해당 불응성 증례 질문에 대한 연자 답변이다.

상담·의뢰 때 남길 기록

- ☐ heartburn과 globus 각각의 치료 전·후 변화를 기록한다.
- ☐ 산분비억제제·위장운동촉진제·신경조절제의 사용 이력을 정리한다.
- ☐ 신경조절제는 **장–뇌 상호작용에 따른 과민성 치료**라는 연자 설명을 활용한다.