
의료진 진료 카드 · ASL-047

안정적이던 혈당이 갑자기 나빠질 때

민세희 연자 Q&A: 한 번의 변화값보다 동시 혈당과 임상 경과를 함께 본다.

두 임상 양상을 구분해 원인을 재평가한다



연자 Q&A · 경과에서 읽을 단서

췌장질환 쪽	안정적이던 환자가 수개월 내 HbA1c가 뚜렷하게 상승하고 체중감소·복통 등이 동반되는 양상.
LADA 쪽	비교적 젊거나 마른 환자에서 인슐린 요구량이 빠르게 증가하고 C-peptide가 낮아지는 양상.

연자 Q&A · C-peptide 의 임상 해석

0.6~1.8 ng/mL	인슐린 분비부전 가능성을 함께 고려하는 범위로 소개했다.
<0.24 ng/mL	매우 심한 인슐린 분비부전을 시사하는 수치로 소개했다. 동시 혈당과 경과를 함께 해석한다.

연자 Q&A · 추가 평가 연결

자가항체	LADA가 의심되면 GAD 항체 등 췌도 자가항체 검사를 제안했다.
의뢰 시 전달할 경과	HbA1c의 시간에 따른 변화, 체중감소·복통 여부, 인슐린 요구량 변화와 동시 혈당·C-peptide를 묶어 전달한다.

급격한 HbA1c 상승이나 C-peptide 감소를 정의하는 절대 수치 기준은 없다는 연자 답변이다. 단일 변화값을 췌장암 또는 LADA 진단 기준으로 쓰지 않는다.