
대변에서 벌레 같은 것이 나왔다면

사진·동영상이나 나온 충체는 종류를 가리는 데 도움이 됩니다. 생긴 모양과 먹은 음식, 해외 체류 이력을 함께 봅니다.

둥근 형태와 납작한 마디는 다릅니다



둥글고 긴 회충류와 납작하고 마디가 있는 조충류는 치료약이 다릅니다. 그림만으로 종류를 확정하지 않습니다.

진료 때 함께 전할 정보

나온 모습

언제 나왔는지, 길이와 모양, 마디가 보이는지, 움직였는지 전합니다. 사진이나 동영상도 도움이 됩니다.

노출 이력

해외 여행·거주·근무, 연어·송어 등의 생선회와 육회 등 날고기를 먹은 이력을 전합니다.

강의에서 소개한 모양과 감염 경로

회충	둥글고 길며 수컷 13~17cm, 암컷 20~35cm입니다. 환경에서 성숙한 알을 먹어 감염됩니다.
구충·편충	구충은 약 1cm로 맨발의 피부를 통해 유충이 들어올 수 있습니다. 편충은 3~5cm이며 성숙한 알을 먹어 감염됩니다.
조충류	납작하고 길며 마디가 있습니다. 광절·동해열두조충은 연어·송어 등 생선회, 무구조충은 육회 등이 감염원이 됩니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

종류에 맞는 치료와 예방을 이어갑니다

아래는 강의에서 소개한 치료입니다. 모양만 보고 스스로 약을 고르기보다 진료에서 종류와 용량을 정합니다.

강의에 제시된 치료약

회충·구충	알벤다졸(albendazole) 400mg 경구 1회
편충	알벤다졸 400mg 경구, 3일간
광절·동해열두조충	프라지콴텔(praziquantel) 10mg/kg 경구 1회
유구·무구조충	프라지콴텔 10mg/kg 경구 1회

마디 모양은 단서이며 전부는 아닙니다

성숙한 마디가 가로로 넓으면 광절·동해열두조충, 세로로 길면 유구·무구조충 계열을 생각합니다. 미성숙 마디는 구분하기 어렵습니다. 유구조충의 알은 사람 몸에서 낭미충증을 일으킬 수 있어 종류를 가리는 데 주의합니다.

치료 뒤와 예방

1. 강의에서는 프라지콴텔 치료 뒤 대변으로 나온 충체를 가져와 추가 조치가 필요한지 평가받도록 설명했습니다.
2. 연자 Q&A에서는 예방 목적으로 알벤다졸을 정기 복용할 필요는 없다고 답했습니다.
3. 기생충 예방을 위해서는 음식을 잘 익혀 먹는 것이 중요하다고 강조했습니다.

내시경에서 보이는 경우도 있습니다

구충은 십이지장, 편충은 주로 맹장에서 보일 수 있습니다. 납작하고 긴 조충을 내시경에서 발견했을 때는 강의에서 조직을 떼는 검사를 피하도록 설명했습니다. 의료진에게 나온 모습과 치료 이력을 알려 주세요.

구충제 하나가 모든 기생충에 듣지는 않습니다

둥근 회충류에는 알벤다졸, 납작한 조충류에는 프라지콴텔이 쓰입니다. 종류와 몸무게에 맞춰 진료에서 치료를 정합니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/infectious/asl28-worm-like-material-in-stool/