당뇨, 끼니 리듬과 저혈당 대처

1 왜 하루 세 끼인가요 — 오래 굶었다 몰아 먹기가 가장 나쁩니다

피하세요 — 긴 공복·몰아 먹기	권합니다 — 적어도 하루 세 번
• 굶는 동안 **저혈당**(새벽에도) • 몰아 먹으면 **혈당이 확 오름**	• 바쁘면 **두유 한 팩·바나나 반 개**라도 • 간헐적 단식은 **주치의와 먼저 상의**

2 바쁜 아침엔 이것만이라도



- **삶은 계란 2개** — 엘리베이터에서 씹으면 내릴 때쯤 다 먹습니다
- **단맛 없는(무가당) 두유** 한 팩
- **단백질바** — 포장의 당류가 적은 것
- **초콜릿·과자는 피하기** — 영양은 없고 당만 올림

3 **단 것은 '날을 정해서'** — 너무 참으면 와르르 무너지기 쉬우니 **'일주일에 한 번'**처럼요.

4 저혈당 — 재 보고, 당 먹고, 15분 뒤 다시 재기

1. **식은땀·손 떨림·두근거림·어지럼·심한 배고픔**이 오면
2. **먼저 손가락 혈당 재기** — 잴 수 없으면 당부터
3. **70 미만이면 빠른 당 15~20g** — 주스·일반 콜라 반 컵(약 120mL), 설탕·꿀 1큰술, 사탕(포장 표시로 15g만큼) · 초콜릿은 ✕(지방 때문에 느림)
4. **15분 뒤 다시 재기** — 아직 70 미만이면 3단계부터 다시(70 넘을 때까지)
5. **회복된 뒤** 식사가 멀면 탄수화물+단백질 간식 — 예: 두유 한 팩과 바나나 반 개

재서 70 아래면 사탕·주스가 **맞는 응급처치**입니다. **정신이 흐리거나 삼키지 못하면 입에 넣지 말고 바로 119.**

5 저혈당이 자주 오면 — 약을 조정할 신호

기록해 오세요	그다음 — 미리 간식	그래도 오면
언제·몇이었는지, 언제 무엇을 먹었는지	저혈당 오던 때 1~2시간 전에	병원에서 **약 조정** — 혼자 끊지 마세요

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

근거 — 대한당뇨병학회 진료지침 2023·저혈당 안내 · 미국 CDC·미국당뇨병학회(ADA) 저혈당 대처

교육·참고용 안내문입니다. 약 조정은 담당 의사와 상의해 정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/diabetes-meal-rhythm-hypo-card/