# 혈압·혈당을 낮추는 운동 처방 — 식후 15분, 버티기 운동

운동은 양보다 배치가 중요합니다. 몰아서 하는 운동보다 짧게 자주 하는 운동이 혈당이 튀는 것을 억제하고, 이완기 혈압이 높다면 버티는 운동(등척성 운동)을 더합니다.

## 먼저, 이 네 가지만 기억하세요

| 항목 | 처방 | 왜 · 어떻게 |
|---|---|---|
| 유산소 운동 | **30분×주5회** | 몰아서 하는 주말 3시간보다 낫습니다 |
| 식후 걷기 | **15분×3번** | 저녁 한 번 1시간보다 낫습니다 |
| 버티기 운동 강도(악력기) | **최대 악력 30%** | 2분 버티고 1분 쉬기 |
| 근력운동 순서 | **하체부터** | 큰 근육을 먼저 움직입니다 |

## 나눠서, 자주 — 언제 어떻게 움직일지



식사 후 바로 앉지 말고 15분 걷기

**몰아서 하지 말고 나눠서 · FREQUENCY**

- **1. 주말 3시간보다 30분씩 주 5회**가 낫습니다
- **2. 매일 몸을 움직이는 습관**이 핵심입니다

**식후엔 짧게, 여러 번 · TIMING**

- **1. 저녁 한 번 1시간보다 식후 15분씩 3번**이 낫습니다
- **2. 식사 후 바로 앉지 말고** 짧게라도 걸어 보세요

## 운동 종류별로 혈압이 얼마나 떨어질까요

| 운동 종류 | 수축기 ↓ mmHg | 이완기 ↓ mmHg | 이럴 때 특히 |
|---|---|---|---|
| **유산소 운동**<br>걷기·달리기·자전거 | **4.49** | **2.53** | 기본 운동 — 혈압이 이미 높은 분에서 더 크게 떨어졌습니다 |
| **근력 운동(동적)**<br>기구·밴드 근력운동 | **4.55** | **3.04** | 고혈압 전 단계(경계 혈압)에서 효과가 가장 컸습니다 |
| **복합 운동**<br>유산소+근력 | **6.04** | **2.54** | 수축기 혈압을 더 낮추고 싶을 때 — 등척성 다음으로 효과 순위가 높았습니다 |
| **고강도 인터벌**<br>짧고 강하게 반복 | **4.08** | **2.50** | 짧고 강하게 하는 방식 — 효과는 유산소와 비슷했습니다 |
| **등척성 운동(버티기)**<br>악력기·벽 스쿼트 | **8.24** | **4.00** | 이완기 혈압이 높을 때 — 세부 운동 중 벽 스쿼트가 수축기 강하 1위였습니다 |

**이완기 혈압이 높다면: 등척성 운동은 이완기 혈압이 평균 4.00mmHg 떨어져, 유산소·인터벌·복합 운동(2.50~2.54)보다 약 1.5mmHg, 근력 운동(3.04)보다 약 1.0mmHg 더 떨어졌습니다.**

평균값이며 사람마다 다릅니다. 운동하지 않은 대조군과 비교해 안정 시 혈압이 평균 얼마나 내려갔는지입니다(2주 이상 운동한 무작위 대조시험 270개·15,827명).
근거 — Edwards JJ 외, Br J Sports Med 2023 (네트워크 메타분석) · Cornelissen VA·Smart NA, J Am Heart Assoc 2013 (메타분석).

## 이완기 혈압이 높다면 — 버티기 운동(등척성 운동)

| 버티기 운동 처방 | 방법 · ISOMETRIC HOLD |
|---|---|
| **1. 악력기** | 최대 악력의 30%로 2분 쥐고, 1분 쉬기를 4회. 사무실에서도 짧게 할 수 있습니다. |
| **2. 벽 스쿼트·플랭크** | 악력기처럼 측정하기 어려우니, 힘들지만 계속할 수 있는 강도로 2분 버티고 1분 쉬기를 4회 하되 무리하면 시간을 줄이세요. |
| **3. 주의** | 유산소 운동에 더하는 보조 운동이며, **혈압이 아직 조절되지 않았다면 시작 전 담당 의료진과 상의하세요.** |

## 걸음 수보다 강도, 다치지 않게

| 걸음 수보다 강도 · INTENSITY | 다치지 않게 · SAFETY |
|---|---|
| **1. 걸음 수만으로는** 운동량을 판단하기 어렵습니다. 산책은 활동이고, 운동은 숨이 찰 정도의 강도가 필요합니다 | **1. 다치면 운동을 아예 못 하게 됩니다** — 무게보다 횟수를 먼저, 그다음 세트를 늘려 보세요<br>**2. 관절이 아프면 쉬세요** |

## 흔한 오해 바로잡기 · MYTH

| 흔한 오해 | 사실 |
|---|---|
| **"7~8천 보 걸으니 충분하다"** | 걸음 수만으로는 부족합니다. 강도와 근력운동이 함께 필요합니다. |
| **"살이 빠져야 운동할 수 있다"** | 지금 체중에서 시작해도 혈압·혈당이 좋아질 수 있습니다. |

**운동 중 이럴 땐 바로 멈추세요**

운동 중 **가슴 통증·심한 호흡곤란·실신감**이 있으면 즉시 멈추고 응급실로 가시거나 119에 연락하세요. 가벼운 어지럼에도 즉시 운동을 멈추고 쉬시고, 반복되면 진료받으세요.

노쇠·낙상 위험 또는 뇌동맥류가 있으면 기능·영양·병변 위험도와 혈압을 평가해 운동을 조정합니다.

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한고혈압학회 고혈압 진료지침 (2022) · 대한당뇨병학회 당뇨병 진료지침 (2025) 운동요법 · 아산 28회 연수강좌(정창희·백지연·박중철)

*본 자료는 일반적인 운동 원칙을 안내하며, 개인별 운동 강도·종류와 동반질환에 따른 주의사항은 담당 의사와 상의해 정합니다.*

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/exercise-bp-glucose/