# 역류성 식도염, 상처가 아물 때까지

식도 안쪽에 난 **상처**예요. 식도엔 위처럼 위산을 막는 보호막이 없어서 넘어오면 까져요.

## ① 괜찮아져도 약을 더 드시는 이유 — 딱지




피부 상처도 딱지가 앉으면 안 아프지만, 뜯으면 덧나지요. 식도염도 안 아파도 아직 아무는 중일 수 있어요. **증상이 0이 되고도 며칠 더**, 처방대로 거르지 말고 쭉 드세요. **약은 상처 연고, 음식 조절은 상처 안 건드리기**입니다.

## ② 줄이는 건 진료 때 함께 — 심했던 식도염은 계속 드셔야 할 수도

| 1. 처음 (보통 4~8주) | 2. 나아지면 (진료 때) | 3. 증상 0, 며칠 더 드신 뒤 |
|---|---|---|
| 처방대로 **매일**, 거르지 않고 | (하루 세 번이면) 점심 약부터 빼고 **아침·저녁**으로 | 함께 **끊어 보기** — 불편하면 다시 드세요 |

## ③ 먹고 4시간은 눕지 마세요 — 야식 조심




음식은 보통 **4시간쯤** 지나야 대부분 위를 빠져나가요(많이 먹거나 기름지면 더). 그 전에 누우면(소파·낮잠도) 넘어오기 쉬워요. 식사 뒤엔 **바로 걷거나 앉아** 계세요. 밤 12시에 주무시면 저녁은 8시 전에.

## ④ 과식·기름진 음식·술도 넘어오게 해요

| | 과식 | 기름진 음식 | 술 |
|---|---|---|---|
| **왜** | 위가 늘어나 식도 쪽 잠금 근육이 벌어져요 | 위에 오래 머물러 늦게 내려가요 | 까진 곳에 닿아 회복을 방해해요 |
| **이렇게** | 덜 차게, 천천히 | 특히 **저녁**엔 피하기 | **지금은** 피하기 |

남보다 잘 넘어오는 체질이라 억울해도 관리가 답이에요.
그 밖엔 **내게 증상을 일으키는 음식만**(예: 밀가루(빵·면)) 피하세요.

⚠ **피를 토하거나 짜장처럼 검은 변**은 **바로 응급실로**(어지럽거나 식은땀 나면 **119**). **삼킬 때 걸림·살 빠짐**도 미루지 말고 진료. **움직일 때 조이고 쉬면 나아지는 가슴 통증, 식은땀·숨참이 함께 오는 가슴 통증**은 **바로 119**.

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30
근거 — 미국소화기학회 2022 · 서울 합의 2020·2025 · 위 배출 검사 합의 2008 · 미국 흉통 지침 2021

*교육·참고용 안내문입니다. 약을 줄이거나 끊는 시기는 담당 의사와 상의해 정합니다.*

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/gerd-reflux-a5-card/

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE
PATIENT CARD · REFLUX ESOPHAGITIS

# 역류성 식도염, 상처가 아물 때까지

식도 안쪽에 난 **상처**예요. 식도엔 위처럼 위산을 막는 보호막이 없어서 넘어오면 까져요.

## ① 괜찮아져도 약을 더 드시는 이유 — 딱지




피부 상처도 딱지가 앉으면 안 아프지만, 뜯으면 덧나지요. 식도염도 안 아파도 아직 아무는 중일 수 있어요. **증상이 0이 되고도 며칠 더**, 처방대로 거르지 말고 쭉 드세요. **약은 상처 연고, 음식 조절은 상처 안 건드리기**입니다.

## ② 줄이는 건 진료 때 함께 — 심했던 식도염은 계속 드셔야 할 수도

| 1. 처음 (보통 4~8주) | 2. 나아지면 (진료 때) | 3. 증상 0, 며칠 더 드신 뒤 |
|---|---|---|
| 처방대로 **매일**, 거르지 않고 | (하루 세 번이면) 점심 약부터 빼고 **아침·저녁**으로 | 함께 **끊어 보기** — 불편하면 다시 드세요 |

## ③ 먹고 4시간은 눕지 마세요 — 야식 조심




음식은 보통 **4시간쯤** 지나야 대부분 위를 빠져나가요(많이 먹거나 기름지면 더). 그 전에 누우면(소파·낮잠도) 넘어오기 쉬워요. 식사 뒤엔 **바로 걷거나 앉아** 계세요. 밤 12시에 주무시면 저녁은 8시 전에.

## ④ 과식·기름진 음식·술도 넘어오게 해요

| | 과식 | 기름진 음식 | 술 |
|---|---|---|---|
| **왜** | 위가 늘어나 식도 쪽 잠금 근육이 벌어져요 | 위에 오래 머물러 늦게 내려가요 | 까진 곳에 닿아 회복을 방해해요 |
| **이렇게** | 덜 차게, 천천히 | 특히 **저녁**엔 피하기 | **지금은** 피하기 |

남보다 잘 넘어오는 체질이라 억울해도 관리가 답이에요.
그 밖엔 **내게 증상을 일으키는 음식만**(예: 밀가루(빵·면)) 피하세요.

⚠ **피를 토하거나 짜장처럼 검은 변**은 **바로 응급실로**(어지럽거나 식은땀 나면 **119**). **삼킬 때 걸림·살 빠짐**도 미루지 말고 진료. **움직일 때 조이고 쉬면 나아지는 가슴 통증, 식은땀·숨참이 함께 오는 가슴 통증**은 **바로 119**.

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30
근거 — 미국소화기학회 2022 · 서울 합의 2020·2025 · 위 배출 검사 합의 2008 · 미국 흉통 지침 2021

*교육·참고용 안내문입니다. 약을 줄이거나 끊는 시기는 담당 의사와 상의해 정합니다.*

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/gerd-reflux-a5-card/