# 인슐린 주사, 처음 시작하시는 분께

첫 자가 주사를 시작하는 당뇨 환자를 위한 5가지 핵심(보관·소독·부위·회전·용량). 통증을 줄이고 공복혈당에 따라 안전하게 용량을 맞춰 가세요.

## 한눈에 보는 인슐린 시작 수칙

| 시작 용량 | 공복혈당 목표 | 증량 기준 | 주사 간격 |
|---|---|---|---|
| **10** | **80~130** | **> 140** | **2~3** |
| 단위 / 일 (저녁 또는 자기 전 1회) | mg/dL (아침 식전) | mg/dL × 3~4일 연속 시 +2단위 | cm 떨어뜨려 매번 위치 회전 |

## 통증을 줄이는 주사 전 3가지 준비



피부를 살짝 집고 90° 직각으로

**1. 냉장 → 상온 (30분 전)** — 인슐린은 **냉장 보관 (2~8°C)**. 차가운 채로 맞으면 통증이 큽니다. **30분 전 꺼내 상온**에 둔 뒤 사용 (사용 중인 펜은 상온 28일).

**2. 알코올 소독 + 완전 건조** — 알코올 솜으로 닦은 뒤 **완전히 마를 때까지 (약 10초)** 기다림. 알코올이 남은 채 찌르면 따끔거림이 강해집니다.

**3. 피부 집고 90° 직각** — 피부를 살짝 집어 **5~10초 유지** 후 뺍니다. 바늘은 한 번만 사용.

## 주사 부위 — 어디에 맞고, 어디는 피하나요?

| 권장 부위 — 피하 지방이 두꺼운 곳 | ⚠ 피해야 할 부위 |
|---|---|
| ① **복부 (배꼽 5cm 바깥)** — 흡수 가장 빠름, **1순위** | **배꼽 주변 5cm 안** (혈관이 많음) |
| ② **허벅지 앞·바깥쪽** — 무릎 위 한 뼘 ~ 사타구니 한 뼘 아래 | **같은 자리 반복** (지방위축) |
| ③ **둔부 위쪽 바깥** — 흡수 느려 **야간 기저인슐린** 적합 | **멍·붓기·딱딱한 부위** |
| ④ **상완 뒤·바깥쪽** — 보호자 도움 권장 | 운동 직후 · 옷·벨트 조이는 자리 |

같은 부위 안에서도 **매번 2~3cm 떨어뜨려** 주사 위치를 돌려 가며 맞습니다.

## 용량 조절 규칙 — 2단위씩 증량하는 법

**1. 10단위로 시작** — 저녁 또는 자기 전 1회, 매일 같은 시간 · **2. 매일 아침 공복혈당 측정·기록** — 식사·물 섭취 전

| 아침 공복혈당 | 이렇게 합니다 |
|---|---|
| **140 초과가 3~4일 연속** | 다음 날부터 **+2단위 증량** (10→12→14...) |
| **80~130 에 들어오면** | **유지** |
| **저혈당 (70 미만)** | **-2단위 + 진료 문의** |

**즉시 당원 섭취 + 진료가 필요한 경우**

1. **저혈당 증상** — 식은땀·손떨림·어지럼·심한 공복감 → **사탕 3개 / 주스 1컵** 즉시
2. **의식 저하·경련** — 즉시 119, 가족이 있다면 글루카곤 주사
3. **발열·구토·설사로 식사 못 할 때** — 인슐린 임의 중단 금지, 전화 문의 후 조정

**함께 보기** — 설명 슬라이드 「당뇨, 오늘부터 함께 관리합니다」 edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/diabetes-first-visit/

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — ADA Standards of Care in Diabetes 2026 (Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment) · 대한당뇨병학회 2025 진료지침 (인슐린 시작 및 적정화) · FIT (Forum for Injection Technique) 권고

*본 자료는 일반 안내이며 개인의 상태에 따라 처방의 판단이 우선합니다.*

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/insulin-start/