당뇨 전단계(Prediabetes) — 약보다 먼저, 지금 할 일

결과지에 빨간색으로 표시됐지만 아직 당뇨는 아니고, 대개 약 없이 생활 관리로 시작합니다.

내 숫자는 어디에 있나요 — 당화혈색소(HbA1c)

구분	정상	당뇨 전단계 ← 지금 여기	당뇨 · 다른 날 재확인
당화혈색소 2~3개월 평균	**5.6% 이하**	**5.7~6.4%**	**6.5% 이상**
공복혈당 mg/dL	100 미만	100~125 · **생활 관리가 기본**	126 이상

대개 약을 안 쓰는데 왜 알려 드릴까요 — 이유는 두 가지

① 당뇨로 넘어가는 분이 많습니다

그대로 두면 **해마다 100명 중 5~10명**이 당뇨로 넘어갑니다. 넘어가지 않는 쪽에 들도록 지금 시작합니다.

② 당뇨는 증상 없이 서서히 옵니다

처음엔 증상이 거의 없어 "그러려니" 합니다. **당뇨가 와도 모르고 지내면** 그사이 합병증 위험이 커져 꼭 확인합니다.

하지 말 것 vs 이렇게 하세요

많이 하시는 실수 — 하지 마세요	이렇게 하세요
굶기 · 끼니 거르기 굶고 나면 몰아서 먹기 쉽고 오래 못 갑니다.	**제때, 탄수화물·단백질·지방을 골고루** 샐러드만이 아니라 밥·생선·두부·채소를 함께.
탄수화물을 아예 끊기 끊기보다 적당량을 먹고 종류를 바꾸세요.	**빵·떡·면을 줄이고** 잡곡·채소·콩으로 흰 밀가루·흰 쌀로 만든 음식을 바꿉니다.
걷기 같은 유산소만 근력운동은 인슐린(혈당 낮추는 호르몬)이 잘 듣게 합니다.	**엉덩이·허벅지 근력운동 주 2~3회** + 빠르게 걷기 같은 중간 강도 운동 주 150분 이상



샐러드만 ✕ 골고루 한 접시 ○



① 의자 앞에서 천천히 앉기 ② 엉덩이 힘으로 일어서기

체중은 5~7%를 천천히

과체중·비만인 분은 지금 체중의 **5~7%**(70kg이면 3.5~5kg)를 몇 달에 걸쳐 천천히 빼세요. 7% 감량과 중간 강도 운동 주 150분을 함께 한 연구에서 당뇨로 넘어간 사람이 **절반 넘게 줄었습니다.**

다음 검사는 언제?

적어도 1년에 한 번 다시 봅니다. 정확한 시기는 진료 때 알려 드립니다.

소변이 잦고 목이 마르거나 이유 없이 살이 빠지면 기다리지 말고 진료를 받으세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한당뇨병학회 진료지침 2025 · 당뇨병 예방 연구 DPP(NEJM 2002) · Tabák(Lancet 2012) · ADA 기준(AAFP 2018)

교육·참고용 안내문입니다. 식사·운동 강도와 검사 간격은 담당 의사와 상의해 정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/prediabetes-first-card/