# 스테로이드 처방 안압 위험과 안과 추적

투여 경로·용량·기간·과거 반응을 함께 확인

## 스테로이드가 안압을 올리는 경로

**스테로이드 노출**
눈 주변 · 전신 · 비강

↓

**섬유주 변화**
Glycosaminoglycan 침착
방수 유출 저하

↓

**안압 상승**
과거 반응·위험인자와
사용 기간을 함께 평가

## 처방 전 위험 확인

- ☐ 녹내장·고안압 병력 또는 **녹내장 1촌 가족력**, 과거 steroid response
- ☐ 아주 어린 연령·고령, **고도근시**, 1형 당뇨·결합조직질환
- ☐ 경로 ☐ 점안/안연고 ☐ 눈 주변 피부 ☐ 전신 ☐ 비강
  약제·용량 _____ 시작일 _____ 예정 기간 _____

## 시력 변화가 있으면 평가로 연결

**시력 저하 · 안압 상승 평가**

강의에서는 LASIK/LASEK 후 안압이 실제보다 낮게 측정될 수 있음을 설명했습니다. 수술력도 전달하고, 고용량·장기 처방이 필요하면 안과와 협진하며 관찰합니다.

## 경로와 기간에 따른 확인

| 노출 | 강의의 설명 |
|---|---|
| 점안·안연고·눈 주변 피부 | 눈에 가까운 부위에서 오래 쓰는 경우 안압 위험을 강조 |
| 전신 스테로이드 | **고용량·장기간** 위험. 저용량도 **장기간**이면 위험 가능 |
| 비강 스프레이 | 드물지만 안압 상승 사례 보고. 오래 사용하면 설명과 안과 평가 고려 |

## 안과 확인 시점과 후속 계획

**성경림 연자 Q&A · 비강 스테로이드**

Responder는 사용 후 보통 **3~4주**에 안압이 상승한다고 설명하며, 그 시기에 안과에서 한 번 확인하고 이후에는 안과 전문의 소견을 따르도록 답했습니다.

| 강의에서 제시한 시간 정보 | 기록 |
|---|---|
| Responder 빈도 **15~25%**<br>눈에서 **1~3개월** 꾸준히 사용하면 반응, **1개월 이상** 사용 시 주의 | 안과 확인 예정 _____<br>평가 결과 _____<br>후속 일정·처방 협의 _____ |

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
아산 28회 연수강좌 — 내과 의사가 알아야 할 녹내장 핵심 포인트(성경림)


자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/steroid-intraocular-pressure-card/