

# 2026-27절기 독감 예방접종 안내

시기·백신 종류·접종 후 주의



독감 백신은 해마다 유행하는 바이러스와 백신 구성이 달라지고, 접종 후 시간이 지나면 예방 효과도 서서히 줄어들 수 있어 매년 새로 맞아야 합니다.  
올해는 유행이 예년보다 일찍 시작돼 국가 무료접종 일정도 앞당겨졌습니다. 접종 시기와 올해 달라진 점을 확인하세요.

## 👤 누가 맞아야 하나요?

생후 6개월 이상이면 누구나 접종을 권장합니다. 특히 **만 65세 이상, 심장·폐·당뇨 등 만성질환자, 임신부·영유아**는 합병증 위험이 높거나 국가 무료접종 우선 대상이라 꼭 챙기세요. 궁금한 점은 진료 시 편하게 물어보세요.

## 📅 언제 맞나요? 무료접종 시작 시기

국가 무료접종 시작일은 대상군마다 다릅니다. 올해는 조기 유행으로 예년보다 앞당겨졌으니 아래에서 본인 해당 날짜를 확인하세요. 봄까지 유행이 이어지지만, 그렇다고 대상 시작일을 미루면 안 됩니다.

| 어린이·임신부 | 75세 이상 | 70~74세 | 65~69세 |
|---------|--------|--------|--------|
| 9/21    | 10/6   | 10/12  | 10/15  |

※ 위 연령대는 출생연도 기준이며, 접종일 기준 생일 경과 여부와 다를 수 있습니다. 본인의 정확한 해당 여부는 예방접종도우미(nip.kdca.go.kr) 또는 진료 시 확인하세요. 위 대상이 아니어도 자비로 접종할 수 있습니다.

## 🌟 백신 구성은요? 이번 절기도 3가 백신

이번 절기 국가접종도 3가 백신을 사용합니다.

'3가'는 백신에 포함된 독감 바이러스 계통의 수를 뜻하며, 최근 몇 년간 자연 유행에서 확인되지 않은 계통(B형 야마가타)을 뺀 구성입니다. 국내 3가 전환은 지난 절기(2025-26)부터 시작됐고, 무료·유료 백신 모두 이번 절기 권장 3가 구성을 따릅니다. 다만 3가라는 공통점이 제품까지 모두 같다는 뜻은 아닙니다.

| 구분    | 무료 백신과 유료 백신, 무엇이 다른가요?                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 무료 백신 | 무료와 유료 백신 모두 이번 절기 권장 3가 구성을 따릅니다.                                                                   |
| 유료 백신 | 유료 백신에는 제조 방식이 다른 제품(고용량·세포백양 등)이 있어, <b>나이·건강 상태에 맞춰 선택하실 수 있습니다.</b> 제품별 차이와 비용은 진료·접수에서 안내해 드립니다. |

## ❗ 접종 후 이렇게 하세요

| 상황    | 이렇게 하세요                                            |
|-------|----------------------------------------------------|
| 접종 부위 | 문지르지 말고 청결하게 유지하세요. 붓거나 아프면 찬물수건으로 가볍게 냉찜질하세요.     |
| 당일 활동 | 탕·사우나는 피하고, 접종한 팔로 무거운 것을 들지 마세요. 가벼운 샤워는 괜찮습니다.   |
| 몸살·발열 | 타이레놀(아세트아미노펜) 등 해열진통제를 복용해도 됩니다. 물을 충분히 드시고 꼭 쉬세요. |

독감 백신은 살아있는 바이러스가 없는 불활성화 백신(사백신)이라 접종 자체로 독감에 걸리지 않습니다. 접종 후 가벼운 발열·근육통이 나타날 수 있지만, **심하거나 며칠 이상 지속되면 자가 판단하지 말고 진료를 받으세요.**

더 자세한 관리법·회복 흐름은 **"예방접종 후 유의사항 안내"** 안내문을 함께 확인하세요. 몸 상태가 안 좋으면 무리한 일정은 피하세요.

## 🚑 이런 증상이면 즉시 119 또는 응급실

- 입술·얼굴이 붓는다
- 숨쉬기 힘들다
- 온몸에 두드러기가 퍼진다
- 어지럽고 정신을 잃을 것 같다

Ⓜ️ 아나필락시스(대개 접종 후 30분 이내 나타납니다. 접종 후에는 잠시 병원에 머무르며 관찰하세요. 과거 알레르기가 있었다면 미리 알려주세요.

