아이가 자꾸 배가 아파요 검사는 정상인데, 왜 그럴까요?

소아 기능성 복통·과민성 장 증후군 — 약 없이 식사와 생활습관으로 편안해지는 근거 기반 관리

대부분은 위험한 병이 아닙니다

검사에서 이상이 없는 반복성 복통은 대개 '기능성'이며, 시간과 좋은 생활습관으로 대다수가 좋아집니다

90% 이상

반복성 복통으로 병원을 찾은 아이 **10명 중 9명 이상**은 검사에서 위험한(기질적) 원인이 없는 '기능성'입니다.

대부분 식사·생활 관리로 좋아집니다

장이 망가진 것이 아닙니다

혈액검사·내시경에서 이상이 보이지 않지만 복통이 반복되는 흔한 상태입니다. 뇌와 장을 잇는 신경망(뇌-장 축)이 **예민해진 것**입니다.

나쁜 병으로 번지지 않습니다

기능성 복통과 과민성 장 증후군은 암이나 염증성 장 질환으로 **진행하지 않습니다**.

그래도 잘 이해해야 합니다

통증이 반복되면 아이의 불안·수면·학교생활이 힘들 수 있어, 이해하고 관리하는 것이 중요합니다.

Tip · 아이 앞에서는 걱정보다 "괜찮아질 거야"라는 말이 먼저입니다.

근거 · Rome IV 2016

기능성 복통과 과민성 장 — 뇌-장 축의 문제입니다

검사에 나오지 않을 뿐, 아이가 느끼는 통증은 진짜입니다

장이 예민해진 상태

장의 신경이 예민해지면 정상적인 장 운동이나 가스도 뇌에서 **심한 통증**으로 느껴집니다. 이것을 '내장 과민성'이라고 합니다.

꾀병도, 부모 잘못도 아닙니다

예민한 성격이나 꾀병 때문이 아니라 의학적으로 확인된 뇌-장 신경의 반응 변화입니다.

통증을 키우는 '방아쇠'

스트레스·긴장·불규칙한 생활·수면 부족, 특정 음식이 통증을 더 자주, 더 세게 만듭니다. 그래서 식사·생활을 다듬어 과민 반응을 가라앉히는 접근이 효과적입니다.




그림 · 뇌와 장은 신경으로 이어져 있어, 예민해진 신호가 통증으로 크게 느껴집니다(설명용 그림).

근거 · Rome IV 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

효과는 있는데 잘 먹지 못한다면

김효원 교수 Q&A · 처방한 진료팀과 조절합니다.

연자가 소개한 방법

식욕부진이 있을 때 트레스탄을 함께 처방해 호전되는 아이들이 있으며, 그래도 호전되지 않으면 약물휴일이나 주말에 지속시간이 짧은 제형을 사용하는 경험을 답했습니다.

아이의 반응을 공유합니다

약의 효과, 식사량, 식욕·성장 변화를 처방한 진료팀에 알려 함께 조절합니다.



아이의 식사와 몸 상태 변화를 기록해 진료 때 함께 살펴봅니다.

Q&A에서 소개한 약물 조절 방법은 아이를 진료하는 처방팀과 결정합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

반복되는 복통이 아이에게 남기는 것들

통증 그 자체보다, 아이의 일상과 마음에 미치는 영향이 더 클 수 있습니다

불안

"또 아프면 어쩌지" 걱정하며 아플 만한 상황을 피합니다. 불안은 다시 통증을 키웁니다.

우울감

하고 싶은 활동을 못 해 위축되고 기분이 가라앉습니다. 통증과 기분은 서로 영향을 줍니다.

학교 결석

결석·조퇴가 잦아지면 학습과 친구 관계에 영향을 주고, 결석 자체가 불안을 키웁니다.

삶의 질 저하

놀이·식사·여행처럼 또래가 누리는 일상 활동이 줄어듭니다.

수면 문제

잠들기 어렵거나 자다 깨면 피로가 쌓이고, 피로는 통증에 더 민감하게 만듭니다.

가족의 걱정

부모의 불안과 잦은 병원 방문·반복 검사가 아이에게도 전해져 온 가족이 지칩니다.

Tip · 여섯 가지는 서로 꼬리를 뭅니다 — 불안·수면·결석이 다시 통증을 키웁니다.

근거 · Rome IV 2016 · Br J Gen Pract 2026

식욕저하와 배 아픔이 약과 연결되나요?

김효원 교수 강의 · ADHD 약 복용 중인 아이의 변화입니다.

메칠페니데이트

식욕저하·불면·두통·복통이 나타날 수 있는 부작용으로 소개되었습니다.

식사량을 함께 봅니다

식욕저하가 두드러지면 용량이나 약의 종류를 조절하는 과정이 필요하다고 설명했습니다.



약 복용 중 아이의 식사량과 식욕 변화를 함께 살펴봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약의 종류에 따라 반응이 다를 수 있습니다

복용 중인 약 이름을 확인해 주세요.

메칠페니데이트

콘서타·메디키넷·페니드

- 효과가 빠르게 나타나는 중추신경 자극제로 소개했습니다.
- 복용 당일부터 작용하며 제형에 따라 지속시간이 다릅니다.
- 식욕저하·불면·두통·복통을 함께 살핍니다.

vs

아토목세틴 등

비중추신경 자극제

- 효과가 나타나는 데 최소 2주 이상 걸릴 수 있습니다.
- 작용이 나타나면 24시간 효과가 지속된다고 설명했습니다.
- 아토목세틴은 메스꺼움이나 구토가 생길 수 있습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 '먹는 것'과 '생활 리듬'이 중요할까요?

예민한 장은 음식·식사 시간·생활 리듬에 크게 반응합니다 — 약을 늘리기 전에 먼저 다듬을 부분

통증을 키우는 쪽

무엇을·언제·어떻게 먹는지가 통증의 **빈도와 세기**를 바꿉니다.

- 특정 음식이 장에서 가스·수분을 늘립니다
- 어떤 음식은 장을 직접 자극합니다
- 예민한 장은 이 신호를 **통증으로 크게** 느낍니다
- 오래 굶다 몰아 먹으면 더 예민하게 반응합니다

vs

가라앉히는 쪽

규칙적인 식사·충분한 수분·안정된 생활 리듬이 **과민 반응을 달랩니다**.

- 검사가 정상이면 약보다 **식사·생활 조절이 먼저**입니다
- 약물은 최소화합니다
- 부작용이 없는 안전한 첫걸음입니다
- 온 가족이 함께 실천할 수 있습니다

Tip · 순서는 안심 → 식사·생활 조절 → 필요할 때만 약입니다.

근거 · NASPGHAN · Rome IV 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

도움이 되는 식사 습관 6가지

거창한 식이요법이 아니라, 오늘부터 집에서 바로 실천할 수 있는 기본기입니다



규칙적인 식사
아침을 거르지 않고 정해진 시간에 — 몰아 먹으면 장이 예민해집니다

충분한 수분
물을 자주 — 변이 부드러워져 변비형 복통에 특히 도움이 됩니다

적절한 식이섬유
채소·과일·통곡물을 조금씩 — 한꺼번에 늘리면 가스가 찹니다

천천히·꼭꼭 씹기
급히 먹으면 공기를 삼켜 더부룩합니다 — 식사 중 TV·휴대폰 끄기

균형 잡힌 식단
성장기라 무리한 제한은 금물 — 오래 빼기 전엔 의료진과 상의

유산균·페퍼민트(선택)
도움이 되는 아이도 있지만 개인차가 큽니다 — 시작 전 상의

그림 · 정해진 시간에, 물 한 잔과 함께, 화면은 끄고 천천히 먹습니다(설명용 그림).

근거 · NASPGHAN · Rome IV 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

배를 더 아프게 할 수 있는 음식 — 줄여 보세요

아이마다 방아쇠는 다르지만, 아래 음식들은 예민한 장을 자극하는 흔한 원인입니다

음식	왜 아플 수 있나	이렇게 바꿔 보세요
탄산음료 · 사이다	탄산 가스가 배를 부풀려 더부룩함과 통증을 부릅니다	물이나 보리차로
과일주스 · 단것	과당·소르비톨(무설탕 껌·젤리 포함)이 가스·설사를 일으킵니다	주스 대신 생과일을 적당히
카페인	콜라·초콜릿·에너지음료가 장을 자극하고 잠을 방해합니다	특히 저녁에는 피하기
기름지고 튀긴 음식	소화가 느려 식후 복통·더부룩함을 잘 일으킵니다	튀김·패스트푸드 줄이기
맵고 자극적인 음식	아이마다 다르지만 흔한 방아쇠입니다	반복되면 잠시 줄여 반응 보기
유제품 과다(해당 시)	유당불내증이면 우유·아이스크림 뒤 복통·설사가 생깁니다	의심되면 진료 때 확인

주의 · 저포드맵 같은 엄격한 제한식을 아이 스스로·오래 하면 영양과 성장에 해롭습니다. 필요하면 의료진·영양 상담과 함께 짧게.

근거 · NASPGHAN · Rome IV 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

같은 성분도 제형에 따라 다릅니다

김효원 교수의 제형·작용시간 설명입니다.

약 이름	강의에서 소개한 작용시간	제형 특징
페니드	4시간	가루약으로 만들 수 있습니다.
메디키넷	6시간	캡슐을 열어 복용할 수 있습니다.
콘서타	12시간	열어서 먹는 제형이 아닙니다.

어떤 제형을 쓸지는 약효와 부작용, 아이가 약을 먹는 방법을 함께 보고 정합니다.

우리 아이만의 방아쇠 찾기 — 음식·통증 일기

2~4주만 꾸준히 적으면, 반복되는 음식·상황 패턴이 눈에 보입니다

1 📖 **무엇을 적나**

먹은 음식과 시간 · 언제·얼마나 아팠는지 · 배변 상태 · 그날의 스트레스·수면을 짧게 적습니다.

2 📅 **얼마나**

2~4주만 꾸준히 적으면 반복되는 음식·상황 패턴이 보입니다.

3 🩺 **어떻게 쓰나**

진료 때 함께 해석해, 반복되는 방아쇠 음식만 **골라서** 줄입니다. 막연한 광범위 제한이 아닙니다.



핵심 · 기록으로 확인된 방아쇠만 줄이고, 나머지는 골고루 먹여 성장에 필요한 영양을 지켜 주세요.

근거 · 관리 방법 — 음식·증상 일기 2~4주 → 방아쇠 확인 → 표적 조절

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

치료 필요성은 주기적으로 다시 봅니다

아이의 생활 기능과 성장, 약효를 함께 평가합니다.

보통 1년마다

종합 재평가

교재에서는 보통 1년마다 약의 효과와 치료 필요성을 종합적으로 다시 평가한다고 설명했습니다.

효과가 분명하면

주의력·과잉행동·충동성과 생활 기능이 얼마나 좋아졌는지 함께 살핍니다.

호전되어 안정되면

약을 계속 쓰는 경우도 있지만, 상태가 호전되고 안정되면 감량이나 중단을 시도할 수 있다고 설명했습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

하루의 리듬이 장을 편하게 합니다

잠·활동·배변 — 식사만큼 중요한 생활 습관입니다



아침 · 충분한 잠

장 리듬이 안정됩니다

낮 · 등교 유지와 가벼운 운동

매일의 활동이 통증 예민함을 낮춥니다

밤 · 정해진 잠자리

피로는 통증을 키웁니다

Tip · 배변 습관도 리듬입니다 — 아침 식후 화장실에 여유 있게 앉기. 변비는 소아 복통의 아주 흔한 원인입니다.

근거 · 관리 방법 — 규칙적 수면·가벼운 운동·배변 습관

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

우리 아이에게 어떻게 적용할까요?

경고 신호(11쪽)가 없다면, 검사·약물에 앞서 식사·생활부터 단계적으로 시도합니다

1

안심과 이해

의사가 위험한 원인을 배제해 '기능성'으로 확인하고, 위험한 병이 아님을 함께 이해합니다. 통증·음식 일기로 방아쇠를 살핍니다.

위험한 병이 아님을 확인

2

식사 다듬기

규칙적인 식사·충분한 수분·적정 식이섬유를 지키고, 확인된 방아쇠 음식(탄산·단것·카페인·기름진 음식)을 줄입니다.

방아쇠 음식만 골라 줄이기

3

생활 리듬

규칙적인 수면·가벼운 운동·등교 유지와 편안한 배변 습관이 기본입니다. 통증에 온 가족이 너무 크게 반응하지 않는 것도 중요합니다.

잠·운동·등교·배변

4

안 나아지면 진료실로

몇 주 실천해도 나아지지 않거나 경고 증상이 있으면 추가 평가·약물·전문 치료로 조정합니다.

몇 주 뒤 다시 평가

안내 · 우리 아이에게 맞는 식사 조절과 생활 계획은 원내에서 함께 구체적으로 정해 드립니다.

근거 · NASPGHAN · Rome IV 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 신호가 있으면 식사 조절보다 검사가 먼저입니다

하나라도 있으면 기능성으로 단정하지 말고 반드시 추가 평가가 필요합니다

체중 감소 · 성장 지연

다이어트 없이 빠지는 체중, 키·몸무게 성장 곡선에서 벗어나는 경우는 위험한 원인을 찾는 **정밀 검사**가 필요합니다.

식사 조절보다 **검사가 먼저**

혈변 · 밤중 통증 · 반복 발열

대변에 피가 섞이거나, 잠을 깨우는 밤중 통증·밤중 설사, 반복되는 열은 기능성 복통에서는 **드문 경고 신호**입니다.

식사 조절보다 **검사가 먼저**

가족력 · 삼킴 곤란 · 계속되는 구토

염증성 장 질환·셀리악병 가족력, 삼키기 힘듦, 반복되는 구토는 다른 병을 시사하므로 **검사를 우선**합니다.

식사 조절보다 **검사가 먼저**

Tip · 이런 신호는 기능성 복통에서는 드뭅니다. 식사·생활 관리는 위험한 원인을 배제한 뒤 시작합니다.

근거 · 소아 복통 경고 증상

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 7가지

소아 기능성 복통·과민성 장은 이해와 식사·생활 관리로 충분히 좋아집니다

01 아이 앞에서 걱정을 드러내기보다 **"괜찮아질 거야"**라고 안심시켜 주세요

02 기능성 복통·과민성 장은 **뇌-장 축의 문제** — 꾀병도, 부모 잘못도 아닙니다

03 **통증·음식 일기**로 스트레스·식사·수면 등 방아쇠를 함께 찾아봅니다

04 **규칙적인 식사·충분한 수분·등교 유지**가 회복의 기본입니다

05 탄산·과한 주스나 단것·카페인·기름진 음식을 **줄여 보세요**

06 성장기이므로 **무리한 제한식은 금물** — 음식을 오래 빼기 전 의료진과 상의하세요

07 체중 감소·혈변·성장 지연 등 **경고 증상은 바로 진료**·검사로 확인합니다

안심하고, 살펴보고,
식사·생활을 단계적으로

Tip · 이 장을 사진으로 찍어 냉장고에 붙여 두세요.

근거 · Rome IV 2016 · NASPGHAN

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

키·체중과 식욕 변화를 정기적으로 봅니다

초기 식욕저하와 성장 경과를 함께 살펴봅니다.

키와 체중 기록

약을 쓰는 동안 키와 체중을 정기적으로 기록합니다.

초기 변화

처음에는 식욕이 줄고 일시적으로 성장이 늦어질 수 있다고 설명했습니다.

성장 곡선의 경과

연자는 초기 이후 원래 성장 곡선을 따라가는 모습을 설명했습니다. 교재는 약 3년 뒤 회복세를 소개했습니다.

약 조절

식욕저하가 너무 두드러지거나 성장 지연이 보이면 용량 조절이나 약물 변경을 고려합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

복통 약을 더 처방받을 때도 알려 주세요

김효원 교수 Q&A · ADHD 치료 중 약물 병용에 관한 답변입니다.

현재 복용 약

ADHD 약 이름과 함께 다른 병원에서 받은 약도 알려 주세요. 연자는 소아에서 교감신경을 항진시키는 약을 주의한다고 답했습니다.

에나폰·웰부트린

내장과민성 등에 에나폰을 함께 써도 되는지 묻는 질문에, 연자는 웰부트린과 삼환계 항우울제인 에나폰은 ADHD 약과 잘 함께 쓰지 않는다고 설명했습니다.

다른 항우울제 병용

SSRI 계열은 ADHD 약과 대부분 안전하게 함께 쓸 수 있다는 답변도 제시했습니다. 현재 약의 조합을 확인해 정합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

대부분 좋아집니다 — 식사와 생활 관리로 더 편안하게

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

대부분 좋아집니다

안심과 이해에서 시작해, 아이에게 맞는 식사 조절과 생활 계획을 함께 찾아가겠습니다. 궁금한 점은 언제든 문의해 주세요.

참고한 자료

Rome IV 2016(뇌-장 상호작용 장애 분류) · NASPGHAN 소아 기능성 복통 관리 · Br J Gen Pract 2026

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요