위고비·마운자로 사용 중 검사 전 안내

위고비·마운자로 같은 GLP-1 계열 약은 위 배출을 늦춥니다. 대부분 지속할 수 있으나 위험도에 따라 계획합니다. 중단 시 기존 일정(7일째 검사·다음 날 재개, 어려우면 최소 3일 간격)과 전날 맑은 유동식을 검사팀과 정합니다. (아산28 정창희)

먼저 확인할 4가지

마지막 투약일
주 1회 주사는 마지막 주사일로 검사일을 정합니다.

위장 증상
메스꺼움·구토·더부룩함·역류감이 있으면 꼭 알려 주세요.

증량기·고용량
최근 증량했거나 부작용이 있으면 위가 더 늦게 비워집니다.

당뇨 치료 중
혈당약이면 임의로 끊지 말고 처방의와 상의합니다.

약 종류별 일정

약	검사 일정
주 1회 주사 **위고비·오젬픽·마운자로·젭바운드·트룰리시티**	**검사팀과 중단을 정한 경우의 기존 일정: 마지막 주사 후 7일째 검사 + 다음 날 주사 재개** (아산28 정창희) (예: 수요일 주사 → 다음 주 수요일 검사, 목요일 주사). 일정 조정이 어려우면 **최소 3일 이상 비우기**가 차선입니다 — 3일 이상 비우면 위가 비어 있던 비율 92.7%, 1–2일만 거르면 62.5%에 머물렀습니다(2026년 무작위 연구). 증량기·고용량·증상이 있으면 1회 연기 + 전날 맑은 유동식 권장.
매일 쓰는 약 **리벨서스·빅토자·삭센다**	약효가 짧아 대개 **검사 당일 아침 복용·주사만 조정**하면 충분합니다. 증상·증량기·고용량이면 전날 맑은 유동식이 안전합니다. 당뇨 치료는 임의로 끊지 말고 약 이름·마지막 투약일·용량을 알려 주세요.

일정 조정이 어렵다면 — 전날 맑은 유동식이 결정적입니다

검사 전날	평소 식사	맑은 유동식(24시간)
약 계속 사용	위에 음식이 남을 위험 약 25%	**위에 남는 음식 거의 없음**
약 쉬기	약만 쉬어서는 한계	**가장 안전**


검사 전날 — 맑은 음료만

약을 계속 써도 **전날 맑은 유동식을 지키면** 위에 남는 음식이 거의 사라져, 약을 쉰 것과 거의 비슷했습니다 (2026년 무작위 연구). **지속 여부와 중단 시 일정(7일째 검사 또는 최소 3일 간격)은 의료진과 함께 정합니다.** (아산28 정창희)

전날 마셔도 되는 것: 물·보리차·투명한 이온음료·맑은 사과주스·꿀물·커피(우유 없이) · **피할 것**: 우유·요거트·미숫가루·붉은·보라색 음료·술. 단 **위내시경은 검사 8시간 전부터 주스·커피도 금지**(물·보리차·투명 이온음료만), 대장내시경은 대장내시경 준비 안내문의 음료 기준을 따르세요.

⚠ 검사 당일 꼭 알려 주세요

- 메스꺼움·구토, 명치 답답함, 심한 속쓰림, 배가 부풀고 트림이 잦음
- 조금만 먹어도 오래 배부름 · 누우면 신물·음식이 올라옴

위에 음식이 남아 있을 가능성이 있으면 검사 연기, 마취 방식 조정, 위 초음파 평가 등을 의료진이 판단합니다.

검사 종류별 추가 안내

- **금식**은 기본 안내와 같습니다 — 음식은 검사 12시간 전(보통 전날 저녁 9시)부터, 맑은 물은 2시간 전까지. 대장내시경은 장정결제를 끝까지 복용.
- **수면 위·대장내시경, 초음파 내시경, 담도·췌관 내시경**: 위 내용물이 기도로 넘어갈(흡인) 위험 — 약 일정·증상 확인 필수.
- **비수면 복부 초음파**: 위의 음식·가스가 췌장·담낭을 가려 표준 금식 필요 · 수면 검사는 보호자 동반, 당일 운전 금지, 30분 전 도착

함께 보기 — 위내시경 기본 준비(금식·약): edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/egd-prep/ · 상담 ☏ 031-893-4560

위장운동촉진제를 주사 중단의 대안으로 임의 복용하지 않습니다. (아산28 정창희)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — OCULUS 무작위 연구(JAMA Intern Med 2026.5) · 다학회 GLP-1 계열 시술 전 권고 2024/2025 · 미국소화기학회 임상 업데이트 · GIE 2025

본 안내문은 일반적 권고이며, 환자의 동반 질환·복용 약제·검사 종류에 따라 일정이 달라질 수 있습니다. 약 중단·일정 변경 전 반드시 처방의와 상의해 주세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/glp1ra-pre-procedure/