철분제 복용 시 주의사항

처방받은 철분제는 보통 하루 1번, 공복에 먹을 때 가장 잘 흡수됩니다. 차·우유·제산제와는 2시간 떨어뜨리고, 혈색소가 정상이 된 뒤에도 저장철이 찰 때까지(보통 3개월 더) 드세요.

한눈에 보는 복용 원칙

먹는 횟수	떨어뜨릴 간격	효과 확인	복용 기간
하루 1번	**2시간**	**4주쯤**	**+3개월**
처방받은 대로 · 공복이 가장 좋음	차·우유·제산제 (일부 약은 4시간)	혈액검사로 혈색소 확인	혈색소 정상 뒤 저장철이 찰 때까지

이렇게 드세요



물과 함께 공복에 · 차·우유는 떨어뜨려서

처방받은 대로 보통 하루 1번 — 공복(식사 1시간 전)에 먹을 때 가장 잘 흡수됩니다

속이 불편하면 식사 직후에 먹어도 됩니다 — 꾸준히 먹는 것이 우선입니다

부작용이 심하면 이틀에 한 번(격일) 복용도 효과가 비슷해 진료에서 상의합니다

비타민 C는 음식 속 식물성 철의 흡수를 돕지만, 철분제와 함께 먹는 이득은 크지 않습니다 — 오렌지주스 한 잔 정도는 괜찮습니다

같이 먹어도 되는 것과 떨어뜨려 먹을 것

구분	예와 이유	철분제와 간격
같이 먹어도 됨	**물·오렌지주스 한 잔** — 속이 불편할 땐 식사 직후도 괜찮습니다	함께
차·커피	**차·녹차·홍차·커피** — 탄닌(폴리페놀)이 철과 결합합니다	2시간
유제품·칼슘	**우유·치즈·요거트·칼슘제** — 칼슘이 같은 통로로 경쟁합니다	2시간
위산 억제제	**제산제·위산 억제제** — 위산이 줄면 철이 잘 흡수되지 않습니다	2시간
곡물·콩	**시리얼·통밀빵·콩** — 피틴산·식이섬유가 철과 결합합니다	2시간
일부 약	**갑상선약(레보티록신)·일부 항생제(테트라사이클린·퀴놀론)** — 약끼리 결합합니다	4시간

얼마나 먹나요 — 복용 흐름

① 시작	② 4주쯤 혈액검사	③ 혈색소 정상화	④ 보통 약 3개월 더
처방받은 대로 매일 꾸준히 먹습니다	혈색소가 1 g/dL 이상 오르지 않으면 흡수·출혈·복용법을 다시 확인합니다	수치가 좋아져도 여기서 멈추지 않습니다	저장철이 충분히 찰 때까지 먹고, 끝낼 시점은 혈액검사로 확인합니다

흔한 변화와 바로 연락할 신호

흔한 변화 · 계속 드세요	바로 진료 · 연락하세요
검은 변·치아 변색 — 복용을 중단할 필요가 없습니다	**검은 타르변이나 피를 토함** — 위장관 출혈 의심, 어지럼이 없어도 **즉시 응급실로 가세요** (단순 변색과 구별)
변비 — 수분 1.5~2L와 자두즙·식이섬유를 보충합니다	**심한 구역·복통이 1주 이상** — 약 종류를 바꾸거나 주사 철분을 고려합니다
속이 불편함 — 식사 직후에 먹고, 계속되면 격일 복용을 상의합니다	**4주 먹어도 혈색소가 오르지 않음** — 흡수·출혈·복용법을 다시 확인합니다

콩팥병이 있다면 변비 대처도 달라집니다 · 만성콩팥병 4–5단계에서 고칼륨혈증이 있으면 식품의 칼륨에 특히 주의하도록 설명했습니다.
(아산28 · eGFR을 고려한 만성콩팥병의 실제적 관리(장재원))

최은지 연자는 철결핍빈혈(IDA)에서 경구 2가철 100–200 mg/일을 원칙으로 소개하고, 위장장애가 심하면 하루 한 알이나 다른 제형을 선택할 수 있다고 설명했습니다. 용량은 제품의 실제 철 함량으로 결정합니다. (아산28 · Hemoglobin(혈색소) 이상에 대한 접근(최은지))

주사 철분(정맥 철분)을 고려하는 경우

먹는 약 부작용이 계속될 때

4주 먹어도 혈색소가 거의 오르지 않을 때

위·소장 수술 뒤나 염증성 장질환으로 흡수가 안 될 때

만성콩팥병·투석 중일 때 · 임신 후반기 중증 빈혈

출혈이 계속돼 빨리 채워야 할 때

임신·수유 중이라면

용량은 진료에서 확인하세요 — 임신 2~3기 권장량은 하루 30~60mg입니다

철이 많은 음식·하루 식단은 「빈혈 식사 안내」: edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/iron-deficiency-anemia-diet/
진료실 설명 자료 — 철결핍성 빈혈: edu.gwanggyobarun.com/decks/heme/iron-deficiency-anemia/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 2021 BSG Iron Deficiency Anaemia Guideline · 2024 ACOG Anemia in Pregnancy · 2017 Stoffel et al.(Lancet Haematol — 격일 복용 연구) · Li et al., JAMA Netw Open 2020(비타민 C 병용 시험) · KSH 빈혈 진료지침

본 자료는 일반 안내이며, 환자 상태에 따라 처방의 판단이 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/iron-supplement/