

열이 나면 — 독감·코로나 검사는 언제 받나요?

감기약에 해열 성분이 들어 있으면 열이 일시적으로 내려갈 수 있습니다. **약을 먹는데도 열이나 오한이 났고 나오면** 독감(Influenza)-코로나19(COVID-19) 검사를 받으러 오세요.

이럴 때 검사하러 오세요

FEVER

38도 이상 열

해열 성분이 든 감기약을 먹는데도 열이 났고 나올 때

CHILLS

오한

약을 먹는데도 으스스 떨리는 오한이 올 때

48 HOURS

증상 시작 48시간 안


독감 약은 증상이 시작되고 48시간 안에 써야 효과가 큼니다

BEFORE HOLIDAY

주말·연휴 전

병원이 쉬는 동안 48시간이 지나지 않게 미리 검사합니다

검사 결과는 이렇게 읽습니다



결과	이렇게 받아들이세요
음성	너무 일찍 검사하면 바이러스가 덜 붙어 음성이 나올 수 있습니다 . 하루 지나 다시 하면 양성도 됩니다. 증상이 계속되면 다시 오세요.
양성	양성이면 감염 가능성이 높습니다 . 신속항원검사는 걸렸는데도 음성으로 나오는 경우(위음성)는 흔하지만, 안 걸렸는데 양성으로 나오는 경우(위양성)는 드뭅니다. 증상과 유행 상황을 함께 보고 판단합니다.
증상 없음	증상·노출 여부에 따라 검사 시점을 상담하세요. 열이 없어도 호흡기 증상이 생기면 진료받으세요 .

독감이면 이렇게 치료합니다

방법	먹는 약 · 타미플루	주사 · 페라미플루
기간	5일 동안 먹습니다	1회 맞으면 끝납니다
특징	처방받아 집에서 먹습니다	한 번의 정맥주사로 투약을 마칠 수 있어, 먹는 약이 부담스러운 분께 권해 드립니다 . 일부 연구에서는 먹는 약보다 열이 조금 더 빨리 내렸습니다(개인차가 있습니다). 비용은 접수에서 안내해 드립니다.

치료 중에도 **열이 계속되면 폐렴 여부를 엑스레이로 확인합니다**. 나이가 많거나 지병이 있거나 증상이 심하면 48시간이 지나도 치료할 수 있습니다.

집에서는 · AT HOME

공간을 나누고 식사도 따로 합니다.
가족과 있을 때는 **마스크**를 씁니다.
손 씻기를 자주 합니다.
물을 충분히 마시고 꼭 쉽니다.

흔한 오해 · MYTH

"몸살엔 수액이나 엉덩이 주사 한 대면 된다" — 수액은 부족한 수분· 전해질을 채우고, 해열·진통 근육주사는 열과 통증을 덜어 회복을 돕습니다. 다만 독감 자체를 치료하는 약은 아니며, 항바이러스제는 증상·발병 시점·위험요인을 보고 처방합니다.
"독감도 일반 감기약으로 충분하다" — 감기약은 증상만 덜어 줍니다.
"땀을 빼면 낫는다" — 치료법이 아닙니다. 탈수를 조심하세요.
"음성이니 독감이 아니다" — 초기엔 음성일 수 있습니다.

이럴 땐 바로 응급실로 · EMERGENCY

숨이 차거나 가슴이 답답하고 아플 때

땀을 뺀다거나 소변이 크게 줄 때

입술이 파래지거나 **약석이 흐러질 때**

좋아지다가 다시 열·기침이 심해질 때

경가 응급수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~18:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 질병관리청 인플루엔자 관리지침 2025-2026 · 중증 인플루엔자 치료지침(대한내과학회지 2014) · CDC Rapid Influenza Diagnostic Tests 2026 · CDC Influenza Antiviral Medications 2026

본 자료는 열이 날 때 독감·코로나 검사 시점을 안내하기 위한 일반 자료입니다. 나이, 임신 여부, 면역상태, 기저질환에 따라 검사와 치료 시점이 달라질 수 있으니 진료 시 상의해 주세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/respiratory/flu-covid-fever-testing/

