

위고비·마운자로를 시작하는 분께

이 주사는 살을 빼 주는 주사가 아니라, 배부름을 오래 유지하는 주사입니다. 위에서 음식이 내려가는 속도를 늦춰 포만감이 오래 갑니다. 그러니 배부르면 바로 수저를 내려놓으세요. 식사 조절·운동과 함께할 때 효과가 확인되었습니다.

한눈에 보는 치료 방법 (Key Points)

주사 간격

주 1회

배부름을 오래 유지하는 주사

용량 올리는 간격

4주

마다 한 단계씩 · 부작용 없으면 저용량 유지 가능

요요를 줄이는 나의 한 달 감량 목표

_____ kg
원장님이 적어 드립니다

첫 달에 만들 세 가지 습관 (First Month)

EAT · 식사

단백질·채소는 그대로

줄일 것은 빵·면·과자·음료입니다. 배부르는데 억지로 다 먹으면 메스꺼움이 심해집니다.

MOVE · 근력운동

하체·까치발 운동

빨리 빠지면 근육이 빠지고 뇌가 '저전력 모드'가 됩니다. 첫 달에 근력운동을 습관으로 만드세요.

PACE · 속도

천천히 빼야 요요가 줄어듭니다

첫 달은 물이 빠집니다. 숫자에 조금해하지 말고, 목표 속도는 진료 때 함께 정합니다.

흔한 오해 vs 실제 (Common Myths)

자주 듣는 오해 · MYTH

- “주사만 맞으면 빠진다”
- “용량을 올려야 효과가 난다”
- “0.5 펜이 끝나면 치료 끝”
- “예전에 맞아 봤으니 단계를 건너뛰어도 된다”
- “피가 보여야 약이 잘 들어간 것”

실제로는 · FACT

- 효과는 식사 조절·운동을 함께 했을 때 확인되었습니다
- 부작용이 없고 잘 빠지면 저용량을 유지해도 됩니다
- 펜 하나는 증량 과정의 한 단계입니다. 끊으면 다시 찌울 수 있습니다
- 쉬었다가 다시 시작하면 대개 낮은 단계부터 다시 올립니다
- 피하주사라 피가 날 필요가 없습니다. 출혈과 약효는 무관합니다

이럴 땐 꼭 알려 주세요 (Warning Signs)

ABDOMEN · FEVER

열을 동반한 복통

췌장·담낭을 확인해야 합니다. 열이 없어도 복통이 계속되면 바로 진료받으시고, 심한 복통이 이어지면 등으로 퍼지지 않더라도 응급실로 가세요.

DIZZINESS · BP

어지럼·혈압 저하

마운자로를 혈압을 낮춥니다. 혈압약을 조정해야 할 수 있습니다.

HAIR

휴지기 탈모

생길 수 있습니다. 단백질을 챙기면 대개 다시 납니다.

ENDOSCOPY · SURGERY

내시경·수술 전

휴약이 필요합니다. 주사 중이라고 미리 알려 주세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — STEP-1 (NEJM 2021) · SURMOUNT-1 (NEJM 2022) · SURMOUNT-1~4 위장관 분석 (Diabetes Obes Metab 2025) · SURMOUNT-1 혈압 분석 (Heart 2024) · GLP-1 시술 전후 다학회 권고 2024 · 대한비만학회 비만 진료지침 2024

본 자료는 위고비·마운자로를 처음 시작하는 분을 위한 일반 안내이며, 용량과 속도는 개인의 상태에 따라 진료에서 정합니다. 약가·보험 적용 기준은 자주 바뀌어 이 자료에 실지 않았습니다. 검사 전 휴약 일정은 '위고비·마운자로 사용 환자의 내시경·초음파 검사 안내'를 함께 보세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/glp1-starting-guide/

