

중성지방이 높다고 나왔을 때

중성지방은 술·탄수화물·단 음료·운동 부족을 보여주는 "생활습관 점수"에 가깝습니다. 150 미만은 정상, 200 이상은 높은 편, 500 이상이면 췌장염을 걱정해야 하는 수치입니다.

검사 결과에서 보는 핵심

정상 <150 mg/dL	높음 ≥200 mg/dL · 생활습관부터 관리	매우 높음 ≥500 mg/dL · 췌장염 주의	치료 우선순위 생활습관 약은 그다음 고려
--	---	---	--

무엇이 중성지방을 올리나요

중성지방 = "생활습관 점수" 술 — 음주는 중성지방을 빠르게 올립니다 탄수화물 — 흰쌀밥·빵·면 같은 정제 탄수화물 단 음료·단 음식 — 과당 섭취가 많을 때 운동 부족 — 활동량이 적으면 함께 오릅니다	생활습관 외에도 확인할 것 당뇨병 — 혈당 조절이 잘 안 될 때 갑상선 기능 저하 — 대사가 함께 느려질 때 신장 질환 — 지질 대사에 영향을 줍니다 복용 중인 일부 약 — 진료 때 약 목록을 확인합니다
---	--

치료는 생활습관이 먼저입니다

스타틴과 중성지방 스타틴은 나쁜 콜레스테롤(LDL)을 낮추는 약입니다 중성지방은 생활습관으로 먼저 관리합니다 검사에서 한 번 높게 나왔다고 바로 약을 올리지 않습니다	중성지방과 HDL 중성지방이 오르면 좋은 콜레스테롤(HDL)이 떨어지는 경향이 있습니다 운동을 하면 HDL이 오릅니다 운동은 중성지방 관리에도 함께 도움이 됩니다
--	---

흔한 오해 바로잡기

자주 듣는 오해 "지금 먹는 약이 중성지방 약이다" — 스타틴은 주로 LDL을 낮추는 약입니다. 중성지방이 높게 나왔다고 스스로 복용을 중단하거나 용량을 바꾸지 마세요. "오메가3가 고지혈증 약이다" — 오메가3는 식품·건강기능식품·처방약으로 종류가 다릅니다. 일부 처방용 고용량 오메가3만 중성지방 치료에 쓰이며, 시중 영양제와 같은 효과를 기대할 수 없습니다.
--

바로 진료가 필요한 경우 중성지방이 500 이상이라는 결과를 받았다면 다음 예약까지 기다리지 말고 진료를 받으세요. 명치·윗배가 심하게 아프면서 등으로 뻗치거나 구토·발열이 함께 있으면 췌장염일 수 있어 응급실로 가세요. 수치 자체가 췌장염 진단을 뜻하지는 않지만, 원인 확인과 치료 계획을 빨리 상의해야 합니다.
--

