

# 변비약, 이렇게 쓰세요

생활습관을 먼저 챙기고, 자극성 하제는 필요할 때만, 삼투성 하제는 편하게 쓰세요. 변비약을 먹다 설사가 나면 변비약부터 쉬고, 콩팥이 약한 고령자는 관장·마그네슘 제제를 조심하세요.

## 먼저 생활습관부터 챙기세요

- 1 물을 충분히 마시기 — 평소 물을 적게 마셨다면 마시는 양부터 늘려보세요.
- 2 매일 걷는 등 몸을 움직이기 — 규칙적인 신체활동이 배변에 도움이 될 수 있습니다.
- 3 키위·푸룬·차전자피 챙기기 — 배변에 도움이 되는 대표적인 식이섬유 식품입니다. 자신에게 편한 것부터 시작하세요.

## 자극성 하제 vs 삼투성 하제 — 다르게 쓰세요

### 자극성 하제 · 돌코락스·메이킨 등

1. 장을 직접 자극해 배변을 유도하는 약입니다.
2. 자주 먹을수록 변비가 심해집니다(내성·의존). 매일 습관처럼 먹지 마세요.
3. 며칠씩 안 나올 때 필요할 때만 사용하고, 사용 계획은 진료실에서 확인하세요.

### 삼투성 하제 · 마그밀·락톨로스

1. 장 안에 수분을 머물게 해 배변을 돕는 약입니다.
2. 의존이 적어 필요할 때 편하게 쓸 수 있습니다.
3. 락톨로스는 가스·복부팽만이 흔하고, 마그밀은 콩팥 기능을 확인해야 합니다.

## 이런 상황엔 이렇게 하세요

### 변비약 먹다 설사가 나면

1. 설사약을 더하지 말고 변비약부터 쉬세요.
2. 추가 복용을 멈추고 상태를 지켜보세요.
3. 설사가 계속되거나 심하면 진료를 받으세요.

### 콩팥이 약한 고령자는

1. 관장, 특히 인산염 관장을 조심하세요.
2. 마그네슘 제제(마그밀 등)도 주의가 필요합니다.
3. 콩팥 기능이 걱정되면 진료 시 미리 말씀해 주세요.

## 흔한 오해 바로잡기 & 바로 진료가 필요한 경우

### MYTH → FACT

“센 변비약이 좋은 약” → 빠르게 듣는 약이 모두에게 맞는 것은 아닙니다. 내 상태에 맞는 약을 고르는 것이 우선입니다.  
“약 먹을 때만 나오니 계속 먹어야 한다” → 약이 필요할 만큼 변비가 지속되고 있다는 뜻일 수 있습니다. 생활습관을 함께 조절하며 약을 다시 평가하세요.

### ▲ 바로 진료가 필요한 경우

다음 중 하나라도 있으면 바로 진료를 받으세요 — 혈변·검은 변, 원인 모를 체중 감소나 빈혈, 배·항문에서 만져지는 덩이, 마그네슘 제제 복용 중 무기력·졸림·어지럼. ☎ 031-893-4560 심한 복통·구토와 가스·변이 전혀 안 나올, 맥박이 느려지거나 의식이 흐려지면 응급실로 가세요.

