

금연 — 챔픽스 복용법과 무니코틴 전략

금연은 니코틴 중독과 행동(습관) 중독, 두 가지를 함께 다루는 과정입니다. 챔픽스(바레니클린)는 정해진 순서대로 증량하며, 84일을 다 채운 사람이 다시 피우는 비율이 낮습니다.

TITRATION SCHEDULE

정해진 순서대로 늘려 가세요

84

일 (표준 치료기간)

식후 바로 드시면 메스꺼움이 줄어듭니다. 물과 함께 복용하세요.

1

1~3일째

0.5mg 하루 1회. 식후 물과 함께 시작합니다.

2

4~7일째

0.5mg 하루 2회로 늘립니다.

3

8일째부터

1mg 하루 2회. 이 무렵 금연일을 정합니다.

복용 중 알아두기 (Daily Notes)

TAKE WITH

식후 · 물

메스꺼움 완화

SLEEP ISSUE

악몽·불면

저녁 약 시간 조정은 진료 시 상의

RESTART RULE

0.5mg부터

장기간 중단 후 재도전 시 처음
용량으로

FULL COURSE

84일

12주 완주가 원칙

중독의 두 축 (Two Sides of Addiction)

니코틴 중독 · 챔픽스가 돕는 부분

- 갈망·금단 증상 완화** — 담배 생각과 니코틴 금단 증상을 줄여 줍니다.
- 흡연 만족감 차단** — 중간에 한 대를 피워도 예전만큼 만족스럽지 않게 합니다.
- 보통 12주(84일) 치료** — 용량과 기간은 효과·부작용에 따라 담당 의사가 조정합니다.

행동(습관) 중독 · 스스로 관리할 부분

- 계기 상황 미리 알아두기** — 식후·커피·스트레스처럼 담배가 떠오르는 순간을 파악합니다.
- 술자리가 가장 큰 고비** — 미리 대처 계획을 세워 두세요.
- 무니코틴 전자담배로 니코틴부터 끊는 방법도 있습니다** — 행동(습관)은 나중에 끊는 방식이며, 진행 여부는 진료 시 상의하세요.
- 한 번 피웠다고 포기하지 마세요** — 복용을 멈추지 말고 계속 이어가세요.

즉시 진료가 필요한 경우 (Call Clinic Now)

복용 중단 후 바로 연락

- 자살 생각, 갑작스럽고 심한 기분·행동 변화** — 즉시 복용을 멈추고 연락하세요.
- 얼굴·입술·혀·목 부종, 호흡곤란** — 응급 상황이니 바로 응급실로 가거나 119에 연락하세요.
- 입안 등 점막 병변을 동반한 발진** — 복용을 멈추고 진료받으세요.
- 경련(발작)** — 즉시 복용을 멈추고 응급실로 가세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: 국가암정보센터 「금연 약물요법」(2023) · WHO Clinical Treatment Guideline for Tobacco Cessation in Adults (2024) · Cochrane Database Syst Rev 2016(PMID 27158893) · Lancet 2016 EAGLES(PMID 27116918) · Nicotine Tob Res 2019(PMID 29986105). 본 자료는 일반 복약 안내이며 개인 증상과 제시작 시점은 담당 의사의 판단을 우선합니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/smoking-cessation-varenicline/