

체중 감량, 한 달 2kg이 정답인 이유

GLP-1 계열 약물을 쓰지 않고 식사·생활습관으로 체중을 관리하는 분들을 위한 안내입니다. 빨리 빼는 것보다 천천히, 오래 유지하는 방법을 정리했습니다.

왜 천천히 빼야 할까요?

굵거나 단식하면 생기는 일

굵거나 단식하면 **근육부터 함께 빠지고**, 몸이 에너지를 아끼는 '저전력 모드'로 바뀌면서 요요가 오기 쉽습니다. 탄수화물을 전부 끊을 필요는 없습니다. 줄여야 하는 것은 흰쌀·빵·단 음료 같은 **정제 탄수화물**이고, 단백질과 채소는 그대로 유지합니다.

체중이 빠지는 방식

체중은 **계단식으로** 빠집니다. 며칠 정체돼도 실패가 아니며, **1년 이상 꾸준히 유지**해야 몸의 기준점이 서서히 바뀝니다. 목표는 **한 달 2kg 안팎(주 0.5~1kg 이내)**이 정답입니다 — 빨리 빼기보다 오래 유지하는 속도가 중요합니다.

흔한 오해

"적게 먹을수록 빨리 빠져서 좋다" — 빨리 빼면 근육 손실과 절전 반응이 커져 오히려 요요 위험이 높아집니다.

"밥 끊고 고기만 먹으면 된다" — 탄수화물을 전부 끊을 필요는 없습니다. 정제 탄수화물만 줄이면 됩니다.

한눈에 보는 핵심 수치 (한국 성인 기준)

과체중 기준

23

BMI 이상 (아시아 기준)

비만 기준

25

BMI 이상

감량 속도

2

kg / 월 안팎 (주 0.5~1kg)

유지 기간

1년+

몸의 기준점이 바뀌는 기간

나의 목표 감량 속도 : _____ kg / 월

실천 원칙 (Do & Don't)

이렇게 하세요 · DO

1. 흰쌀·빵·단 음료 같은 정제 탄수화물만 줄이기
2. 단백질·채소는 끼니마다 그대로 유지
3. 근력 운동을 함께해 근육 지키기
4. 인바디·체중은 하루 숫자보다 **몇 주 흐름**으로 보기 — 수분 상태에 따라 흔들립니다

이것은 피하세요 · DON'T

1. 극단적인 단식·굶기·식사 거르기
2. 고기·단백질 한 가지만 먹고 탄수화물 완전히 끊기
3. 며칠 정체됐다고 포기하기 — 계단식 정체는 정상입니다
4. 목표 체중에 도달했다고 관리를 바로 끝내기

이럴 땐 응급실·바로 진료 · IMPORTANT

식사를 심하게 제한하는 중 **실신·의식 저하·물도 못 마시는 상태**가 있으면 계획을 멈추고 응급실로 가세요. **반복 구토· 일상생활이 어려운 쇠약감**이 있으면 즉시 진료받으세요. 당뇨약 복용 중이면 식사를 크게 줄이기 전에 의료진과 먼저 상의하세요. (☎ 031-893-4560)

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진
근거 — 대한비만학회 비만 진료지침 2022(8판) · 2024(9판)

본 자료는 일반적 권고이며, 목표 감량 속도는 개인의 건강 상태에 따라 다를 수 있습니다. GLP-1 계열 약물 사용 중이면 담당 의사와 별도로 상담하세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/weight-loss-2kg-month/

