

위내시경 (EGD) 검사 준비 안내문

위내시경의 정확도와 안전은 **음식**이 결정합니다. 음식물 잔류 시 시야 방해와 흡인 위험이 있습니다.
항혈전제·특수 약물 복용 환자는 임의 중단 없이 예약 시 의료진과 상의하세요.

음식 타임라인 — 가장 중요한 한 가지

- 12** 검사 12시간 전 (보통 전날 저녁 9시) — **음식 완전 중단**. 일반식·우유·요구르트·유제품·과일·견과류·껌·사탕 모두 금지. 저녁은 가볍게 흰밥·죽·수프 정도로 마무리. 늦은 저녁 식사·야식은 위 잔류 위험이 크므로 피합니다.
- 2** 검사 2시간 전 — **맑은 액체도 중단**. 그 이전까지는 물 한 모금 가능 범위의 **맑은 물·보리차·이온음료(투명색)**만 소량 가능. 우유·주스·커피·차·붉은·보라색 음료·탄산음료는 8시간 전부터 모두 금지 (사이다·콜라 포함).
- 0** 검사 직전 — **절대 금식 + 흡연·껌·사탕 금지**. 침 삼키는 정도만 OK. 혈압약 등 꼭 필요한 약은 검사 **4시간 전까지** 소량의 물(50mL 이하)과 복용 — 자세한 복용 지시는 예약 시 안내합니다.



특수 약물 사용 환자 — 검사 예약 시 반드시 알려주세요

GLP-1 계열 (위고비·마운자로·오젠폭 등)

왜	위 배출이 늦어져, 음식을 지켜도 위에 음식이 남을 위험이 약 4~5배 높습니다(연구 종합). 남아 있으면 검사를 미룰 수 있습니다.
주 1회 주사	마지막 주사 후 7일째 검사 + 다음 날 재개 권장 (주간 주기 유지).
7일이 어려우면	마지막 주사 후 최소 3일 이상 지나 검사 + 전날 24시간 맑은 유동식 , 일정은 의료진과 상의.
증량기·고용량 위장증상	최근 증량·고용량·메스꺼움·구토·복부팽만 시 위험이 더 크니 미리 알려주세요 .
매일 제제·당뇨	매일 제제는 대개 당일 아침만 거름. 당뇨 임의 중단 금지. 약 이름·용량·마지막 투약일 을 예약 때 알려주세요.

상세: '위고비·마운자로 사용 환자 — 검사 전 안전 안내' 유인물

항혈전제 (아스피린·플라빅스·와파린·NOAC)

- 단순 관찰·조직검사 위내시경** → 대부분 약 중단 없이 가능 (출혈 위험 낮음).
- 용종 절제·치료 내시경** → 고위험 시술로 약제별 중단 기간이 다릅니다 — **플라빅스 5-7일, 와파린(warfarin) 5일 전**(INR 확인), **DOAC 48시간 초과** 조정 필요.
- 자가 중단 금지** → 심혈관·뇌졸중 위험과 출혈 위험을 함께 보아야 하므로 반드시 주치의 상의 후 결정.
- 검사 예약 시 약 목록 전체 지참** — **은행잎 등 영양제·한약** 포함, 출혈 영향 약 확인.

복약·당일 도착 · IMPORTANT

- **혈압약** 검사 4시간 전 소량의 물(50mL)과 복용 OK
- **당뇨약·인슐린** 예약 시 개별 지시 확인 (자가 중단 금지)
- **철분제·개비스콘 등 코팅제** 예약 시 중단 확인 (시야 방해)
- **30분 전 도착** · 신분증·약 목록 지참

수면내시경 시 보호자 동반 · 검사 후 24시간 운전·음주·중요결정·기계조작 금지 — **꽤 것 같아도 약효는 남아 있습니다.**



검사 전·후 즉시 연락 사유

- 검사 전** 감기·기침·발열·새 증상 — 연락 주시면 연기 여부를 정합니다
 - 검사 전** 음식·물 실수로 섭취 (시간 명시)
 - 검사 후** 검은변·혈변·심한 복통·구토
 - 검사 후** 발열 38°C 이상·가슴 통증·호흡곤란
- ☎ **031-893-4560** 즉시 연락 — 피를 토함·검은변이나 혈변이 많이 나옴·심한 복통·가슴 통증·호흡곤란은 시간과 관계없이 **응급실로(119)**

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 근거 — 대한소화기내시경학회 · ASGE 2023 · AGA/ASA 2024 (GLP-1RA) · OCULUS RCT 2026 · GLP-1 위잔류 메타분석 2024-2026

본 안내문은 일반 권고이며, 환자별 기저질환과 복용 약제에 따라 처방·일정이 달라질 수 있습니다. GLP-1RA·항혈전제 사용 환자는 반드시 사전 상담 후 검사 일정을 확정합니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/egd-prep/