

중성지방이 높다고 나왔을 때

중성지방은 술·탄수화물·단 음료·운동 부족을 보여주는 "생활습관 점수"에 가깝습니다. 150 미만은 정상, 200 이상은 높은 편, 500 이상이면 췌장염을 걱정해야 하는 수치입니다.

검사 결과에서 보는 핵심

정상 <150 mg/dL	높음 ≥200 mg/dL · 생활습관부터 관리	매우 높음 ≥500 mg/dL · 췌장염 주의	치료 우선순위 생활습관 약은 스타틴부터
--	---	---	---

무엇이 중성지방을 올리나요

중성지방 = "생활습관 점수" 술 — 음주는 중성지방을 빠르게 올립니다 탄수화물 — 흰쌀밥·빵·면 같은 정제 탄수화물 단 음료·단 음식 — 과당 섭취가 많을 때 운동 부족 — 활동량이 적으면 함께 오릅니다	생활습관 외에도 확인할 것 당뇨병 — 혈당 조절이 잘 안 될 때 갑상선 기능 저하 — 대사가 함께 느려질 때 신장 질환 — 지질 대사에 영향을 줍니다 복용 중인 일부 약 — 진료 때 약 목록을 확인합니다
--	---

치료는 생활습관이 먼저입니다

스타틴과 중성지방 중성지방 관리는 생활습관 교정이 기본입니다 약이 필요하면 스타틴부터 — 중성지방이 높아도 심장·뇌혈관 위험 감소 근거가 가장 확실한 1차 약입니다. LDL을 목표까지 낮춘 뒤 필요 시 중성지방 약을 더합니다 500 mg/dL 이상은 예외 — 췌장염 위험 때문에 중성지방을 먼저 빨리 낮추는 약(페노피브레이트 등)을 우선 고려합니다	중성지방과 HDL 중성지방이 오르면 좋은 콜레스테롤(HDL)이 떨어지는 경향이 있습니다 운동을 하면 HDL이 오릅니다 운동은 중성지방 관리에도 함께 도움이 됩니다
--	---

흔한 오해 바로잡기

자주 듣는 오해 "지금 먹는 약이 중성지방 약이다" — 중성지방이 높아도 심장·뇌혈관 위험을 줄이는 첫 번째 약은 스타틴입니다. 스타틴으로 LDL을 먼저 낮춘 뒤 필요 시 중성지방 약을 더하므로, 수치가 높게 나왔다고 스스로 복용을 중단하거나 용량을 바꾸지 마세요. "오메가3가 고지혈증 약이다" — 오메가3는 중성지방을 일부 낮추고 항염증 효과가 있지만, LDL은 낮추지 못합니다. 식품·건강기능식품·처방약으로 종류가 다르며, 일부 처방용 고용량 오메가3만 중성지방 치료에 쓰이며, 시중 영양제로 처방약과 같은 치료 효과를 기대할 수는 없습니다.
--

바로 진료가 필요한 경우 중성지방이 500 이상이라는 결과를 받았다면 다음 예약까지 기다리지 말고 진료를 받으세요. 명치·윗배가 심하게 아프면서 등으로 뻐치거나 구토·발열이 함께 있으면 췌장염일 수 있어 응급실로 가세요. 수치 자체가 췌장염 진단을 뜻하지는 않지만, 원인 확인과 치료 계획을 빨리 상의해야 합니다.

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402·404호 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 2022 한국 이상지질혈증 진료지침 제5판(한국지질·동맥경화학회) · 2026 ACC/AHA 이상지질혈증 지침 · National Lipid Association 2023 Clinical Perspective(J Clin Lipidol, PMID 37271600) · Diagnosis and Treatment of Hypertriglyceridemia(Dtsch Arztebl Int 2019, PMID 31888796)

본 자료는 일반적 설명이며, 정확한 진단과 치료는 검사 결과와 병력을 확인한 의료진과의 상담을 따릅니다. 개인별 목표 수치와 약물 조정은 담당의가 결정합니다.

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/high-triglycerides/



집에서 다시 보기