

감기 뒤 기침이 오래 갈 때

감기(Common cold)를 앓고 나면 기관지가 예민해져 기침이 몇 주 동안 이어질 수 있습니다. 오래 가는 기침의 흔한 원인과, 다시 진료가 필요한 경우를 정리했습니다.

감기 뒤 기침, 왜 오래갈까요

기관지가 예민해진 상태 · AIRWAY SENSITIVITY

감기 후 2주가 넘도록 기침이 이어지는 경우가 있습니다. 감염을 앓으며 기관지가 예민해진 상태이기 때문입니다.

헛기침이 기침을 부르는 악순환 · COUGH CYCLE

헛기침을 할 때마다 목에 상처가 나서 기침이 길어집니다. 참을 수 있는 기침은 참고, 사탕·껌·미지근한 물을 활용하세요.

오래 가는 기침의 흔한 원인

오래 가는 기침의 흔한 원인 1·2위는 비염(후비루)과 역류성 식도염입니다. 원인에 따라 코 스프레이나 식도염 약을 사용합니다.

비염 · 후비루 · NASAL DRIP

코물이 목 뒤로 넘어가 기침을 유발할 수 있습니다. 코 스프레이 사용법은 **알러지 비염 코 스프레이 사용법** 안내문을 참고하세요.

역류성 식도염 · REFLUX

속쓰림·신물 같은 증상이 함께 있다면 역류가 기침과 관련될 수 있어 식도염 약을 사용합니다.

다시 진료가 필요한 경우

FEVER · SPUTUM

열이 나거나 가래가 늘 때

열이 나거나 누런 가래가 늘면 엑스레이를 찍어 확인합니다.

BLOOD

가래에 피가 섞일 때

피가 섞인 가래가 보이면 기침 기간과 관계없이 바로 진료가 필요합니다. 피를 많이 뱉으면 응급실로 가세요.

BREATH

숨이 차거나 쌉쌉거릴 때

숨이 차는 증상이 새로 생기면 기침 기간과 관계없이 응급실로 가세요(말하기 힘들 만큼 숨차면 119). 숨참 없이 쌉쌉거림만 새로 생기면 당일 진료를 받으세요.

DURATION

체중이 줄거나 오래 지속될 때

체중감소·식은땀이 동반되거나 기침이 8주를 넘기면 원인을 찾는 검사를 합니다.

흡입기 처방과 흔한 오해

매일 쓰는 흡입기라면 · DAILY INHALER

흡입기는 증상이 없어도 매일 씁니다. 임의로 중단하지 마세요. 자세한 사용법은 **심비코트 라피헬러 흡입기 사용법** 안내문을 참고하세요.

흔한 오해 · FAQ

× "3~8주 기침이면 또 검사해야 한다"

이미 초기 평가를 받았고 호전 중이면 같은 검사를 반복할 필요는 없습니다. 새 증상이 생기면 다시 확인합니다.

× "흡입기는 불편할 때만 쓴다"

매일 쓰도록 처방된 흡입기는 증상이 없는 날에도 꾸준히 사용합니다.

