

운동은 벌칙이 아니라 대사 신호

약을 시작한 첫 주부터 가벼운 걷기를 붙이면 혈당·식욕·수면이 같이 안정됩니다. 목표는 완벽한 운동이 아니라 끊기지 않는 활동량입니다.

걷기는 감량보다 먼저 혈당을 안정시킵니다

식후 10분 걷기만 붙여도 혈당 패턴과 식욕 반응을 줄이는 데 도움이 됩니다.

처음부터 1시간 운동을 목표로 잡으면 오래 못 갑니다. 식후, 출퇴근, 계단, 집안일처럼 **하루에 나눠 넣는 10분**이 더 현실적입니다.

START

첫 목표

식후 10분 걷기, 하루 1회부터 시작합니다.

BUILD


누적 방식

10분 × 3회도 30분 운동입니다. 연속 시간이 아니어도 좋습니다.

SIGNAL

대사 효과


근육이 포도당을 쓰면서 식후 혈당과 졸림이 줄어들 수 있습니다.



식후 10분 걷기

성인 기준은 주 150분, 시작은 절반부터

CDC 권고는 주 150분 중등도 유산소와 주 2일 근력운동입니다. 첫 달은 절반 목표로 충분합니다.



처음 2주는 150분을 채우기보다 **기록이 끊기지 않는 패턴**을 만드는 시기입니다. 진료 때 걸음수보다 실제 가능한 시간을 같이 조정합니다.

WEEK 1

70-90분

하루 10-15분, 주 5-6일. 숨이 약간 차지만 대화 가능한 정도.

WEEK 2

90-120분

컨디션이 괜찮으면 한 번에 20분까지 늘립니다.

TARGET

150분

오심·어지럼 없이 유지되면 주 150분으로 천천히 접근합니다.

약 시작 초반에는 무리한 운동이 독이 될 수 있습니다

식사량이 줄고 수분이 부족하면 어지럼, 저혈당, 탈수가 생길 수 있습니다.

운동은 좋지만, 식사를 거의 못 하는 날의 고강도 운동은 위험할 수 있습니다. 몸이 보내는 신호를 보고 강도를 낮추는 것도 치료입니다.

STOP

멈춰야 할 때

식은땀, 심한 어지럼, 가슴통증, 호흡곤란이 있으면 중단합니다.

HYDRATE

수분 먼저

구토·설사·더운 날에는 운동보다 수분과 전해질 보충이 우선입니다.

LOW GLUCOSE

당뇨약 병용

인슐린·설폰요소제 사용자는 운동 전후 저혈당 증상을 확인합니다.



수분·회복

운동복을 입기 전에도 운동은 시작됩니다

주차, 계단, 청소, 산책처럼 생활 안에서 활동량을 올리면 실패율이 낮습니다.



생활 속 루틴

운동은 별도 일정이 아니라 생활 흐름에 붙일 때 오래 갑니다. **식후-양치-걷기**처럼 이미 있는 습관 뒤에 붙이세요.

ANCHOR

습관 연결

식사 후 10분, 퇴근 후 한 정거장, 전화 통화 중 걷기.

PAIN

관절 통증

무릎·허리가 불편하면 평지 걷기, 실내 자전거, 수중운동을 고려합니다.

SLEEP

수면 보너스

낮 활동량이 늘면 밤 수면의 질이 좋아지고 야식 욕구도 줄 수 있습니다.

이번 회차는 10분부터 쌓기

이번 주는 오래 하는 운동보다, 식후와 일상 속에 자주 넣는 움직임이 목표입니다.

01 운동 시작은 식후 **10분** 걷기면 충분합니다.

02 처음부터 주 150분을 강박적으로 채우지 않아도 됩니다.

03 식사불가·탈수·어지럼이 있으면 운동 강도를 낮춥니다.

04 운동은 별도 이벤트가 아니라 생활에 붙이는 루틴입니다.

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요